

臨證指南醫案

臨證指南醫案目

卷二

欬嗽

吐血

失音

肺痿

[illegible]

臨證指南醫案卷二

潯關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南山岫雲同較

姪旦王堂

咳嗽

某<sup>五</sup>寒傷衛陽咳嗽。

川桂枝<sup>五</sup> 杏仁<sup>三錢</sup> 苡仁<sup>三錢</sup> 炙草<sup>四分</sup>

生薑<sup>一錢</sup> 大棗<sup>二枚</sup>

某<sup>三</sup>勞傷陽氣形寒咳嗽 桂枝湯加杏仁

臨證指南醫案 卷二 咳嗽

某<sup>四</sup>寒熱咳嗽當以辛溫治之。桂枝湯去芍加杏仁

某<sup>五</sup>形寒咳嗽頭痛口渴。桂枝湯去芍加杏仁花粉

某咳嗽寒熱

杏仁 三錢  
嫩蘇梗 一錢  
桔梗 一錢  
桑皮 一錢

象貝母 一錢  
生甘草 三分

王<sup>三</sup>脈沉細形寒咳

桂枝 一錢  
杏仁 三錢  
苡仁 三錢  
炙草 五分

生薑 一錢  
大棗 二枚

吳<sup>四</sup>咳嗽聲音漸窒診脈右寸獨堅此寒熱客氣包裹肺

俞鬱則熱先以麻杏石甘湯

寒包熱

又葦莖湯

徐<sup>四</sup>癰屬外邪。癰止聲音不揚。必是留邪干於肺系。故咳  
嗽不已。納食起居如常。中下無病。但以搜逐上焦。勿令  
邪結。可望病已。

麻黃 杏仁 生甘草 射干 苡仁

某<sup>二</sup>風邪阻於肺衛。咳嗽面浮。當辛散之。

麻黃 先煎去沫五分 杏仁 三錢 生甘草 三分 生石膏 三錢

某<sup>三</sup>風襲肺衛。咳嗽鼻塞。當以辛涼解散。

杏仁 嫩蘇梗 桑皮 象貝

桔梗 苡仁

某女風熱上痺痰多咳嗽

杏仁 嫩蘇梗 橘紅 桑葉

白沙參 通草

夏二風鬱咳不止

薄荷 前胡 杏仁 桔梗

橘紅 桑皮 連翹 枳殼

風邪阻

方煩勞衛疎風邪上受痰氣交阻清竅失和鼻塞音低

咳嗽甚皆是肺病辛以散邪佐微苦以降氣為治

杏仁 蘇梗 辛荑 牛蒡子

苡仁 橘紅 桔梗 枳殼

項二 風濕脉虛嗽

桑葉

薄荷

杏仁

象貝

大沙參

連翹

沈 脉右搏數。風濕喘咳。

桑葉

杏仁

象貝

苡仁

瓜蒌皮

白沙參

某女 風濕發熱咳。

薄荷

連翹

杏仁

桑皮

地骨皮

木通

黃芩

炒查

某十歲 頭脹咳嗽。此風濕上侵所致。



連翹錢薄荷七分杏仁一錢桔梗一錢

生甘草三分象貝一錢

某二十風溫上受咳嗽失音咽痛

杏仁薄荷連翹桔梗

生甘草射干

風溫化燥  
邱向來陽氣不充得溫補每每奏效近因勞煩令陽氣

弛張致風溫過肺衛以擾心營欲咳心中先痒痰中偶帶血點不必過投沉降清散以辛甘涼理上燥清絡熱蔬食安閒旬日可安

冬桑葉玉竹大沙參甜杏仁

生甘草

改仁

糯米湯煎

宋二脉右浮數風溫干肺化燥喉間痒咳不爽用辛甘涼

潤劑

桑葉

玉竹

大沙參

甜杏仁

生甘草

糯米湯煎

某積勞更受風溫咽乾熱咳形脉不充與甘緩柔方

桑葉 一錢

玉竹 五錢

南沙參 一錢

生甘草 五分

甜水梨皮 二兩

文風邪鬱蒸化燥發熱後咳嗽口乾喉痒先進清肺

杏仁

花粉

蘇子

象貝

山梔

橘紅

薛三風熱咳。經月不止。

活水蘆根

桑葉

大沙參

生苡仁

地骨皮

象貝

滑石

橘紅

風溫化  
燥傷胃  
陰

某風溫客邪化熱。劫燥胃津。喉間燥癢。嗆咳。用清養胃

陰。是土旺生金意。

金匱麥門冬湯

陸三陰虛體質。風溫咳嗽。苦辛開泄。肺氣加病。今舌咽乾

燥。思得涼飲。藥劫胃津。無以上供。先以甘涼。令其胃喜。

倣經義。虛則補其母

桑葉

玉竹

生甘草

麥冬

元米  
炒

白沙參

蔗漿

某 外受風溫鬱遏。內因肝膽陽升。莫制斯皆。肺失清肅。咳痰不解。經月來。猶覺氣壅不降。進食頗少。大便不爽。津液久已乏上。供肺中之氣。亦不宜暢。謹養胃陰。以杜陽逆。不得泛泛治咳。

麥冬

沙參

玉竹

生白芍

扁豆

茯苓

某 溫邪外襲。咳嗽頭脹。當清上焦。

杏仁

桑皮

桔梗

象貝

通草

蘆根

某二 咳嗽痰黃咽喉不利此溫邪上侵肺氣不清故耳

桑葉

川貝母

白沙參

杏仁

羌鈴

鮮枇杷葉

某八 陰虧挾受溫邪咳嗽頭脹當以輕藥

桑葉

杏仁

川貝

白沙參

生甘草

甜水梨皮

某 脉細數咳嗽痰黃咽痛當清溫邪

桑葉

杏仁

川貝

苡仁

羌鈴

鮮蘆根

又照前方加白沙參冬瓜子

某一 脉右弦大咳嗽痰多黃此屬溫邪上伏之故

桑葉

杏仁

白沙參

南花粉

批鈴

甜水梨肉

王六脉小數能食乾咳暮甚冬藏失納水虧溫伏防其失血用復脉法復脉湯去參薑桂

張七冬季溫邪咳嗽是水虧熱氣內侵交驚蟄節嗽減用六味加阿膠麥冬秋石金水同治是瀉陽益陰方法爲調體治病兼方近旬日前咳嗽復作納食不甘詢知夜坐勞形當暮春地氣主升夜坐達旦身中陽氣亦有升無降最有失血之虞况體豐肌柔氣易泄越當暫停誦讀數日可愈

桑葉

甜杏仁

大沙參

生甘草

玉竹

青蔗漿

陰虛感  
溫邪

楊

二

形瘦色蒼

體質偏熱

而五液不充

冬月溫煖

真氣少

藏其少陰腎臟

先已習習風生

乃陽動之化

不以育陰

驅熱以却溫氣

泛泛乎辛散

為暴感風寒之治

過辛泄

肺肺氣散

斯咳不已

苦味沉降

胃口戕

而腎關傷

致食

減氣怯

行動數武

氣欲喘急

封藏納固之司漸失

內損

顯然

非見病攻病矣

麥冬

米拌

甜沙參

生甘草

南棗肉

沖入青蔗漿一杯

氣分熱

汪五氣分熱熾頭脹痰嗽

連翹

石膏

杏仁

鬱金

薄荷

山梔

又照前方去山梔加蔓皮桔梗

范十四脉左弱右寸獨搏久咳音嘶喑則成噎阻咽平昔嗜

飲胃熱遺肺酒客忌甜微苦微辛之屬能開上痺

山梔

香淡豉

杏仁

括蔓皮

鬱金

石膏

林氏宿病營衛兩虛茲當燥氣上犯暴涼外侮氣餒衛怯

肺先受邪脉浮數咳喘欲嘔上熱下冷宜先清化上氣

臨證指南醫案

卷二

咳嗽

七



有取微辛微苦之屬。

桑葉

杏仁

蘇梗

山梔

象貝

苡仁

糯米湯煎

王十歲嗽緩潮熱。稔年陰虧氣熱所致。

地骨皮

錢三

青蒿

一錢

知母

一錢

生甘草

三錢

南沙參

錢一

川斛

三錢

某嗽已百日。脉右數大。從夏季伏暑內鬱。治在氣分。

桑葉

生甘草

石膏

苡仁

杏仁

蘇梗

史四濕鬱溫邪。總是阻遏肺氣。嘔咳脫痞。卽病形篇中諸

喘滿皆屬於肺。不明口鼻受侵。阻氣之理。清中疎導。乃過病所。伐其無病之地矣。

鮮枇杷葉

杏仁

象貝

黑山梔

堯鈴

馬勃

又輕浮苦辛。治肺咳。哈頗減。咽痛紅腫。皆邪窒既久。壅而成毒。盛乾不喜飲。舌色淡不紅。仍清氣分。佐以解毒。

雞子白

麥冬

大沙參

金銀花

萊豆皮

蔗漿

陸秋暑燥氣上受。先干於肺。令人咳熱。此爲清邪中上。當以辛涼清潤。不可表汗。以傷津液。

青竹葉

連翹

花粉

杏仁

象貝

六一散

又脉右大。瘧熱無寒。暑鬱在肺。當清氣熱。佐以宣通營衛。桂枝白虎湯加麥冬。又熱止。脉右數。咳不已。

知母

生甘草

麥冬

沙參

炒川貝

竹葉

汪女

暑熱入肺爲咳

花粉

六一散

杏仁

橘紅

大沙參

黑山梔皮

暑風

某九咳嗽。頭脹口渴。此暑風襲於肺衛。

杏仁 三錢  
香薷 五分  
桔梗 一錢  
桑皮 一錢

飛滑石 三錢  
絲瓜葉 三錢

倪三兩寸脉皆大。冷熱上受。咳嗽無痰。是為清邪中止。

暑風法。

竹葉  
薑皮  
橘紅  
滑石

杏仁  
沙參

潘氏久咳不已。則三焦受之。是病不獨在肺矣。况乎咳甚。

嘔吐涎沫。喉癢咽痛。致咳之由。必衝脉之傷。犯胃擾肺。氣蒸薰灼。淒淒燥癢。咳不能忍。近日晝暖夜涼。秋暑風。

潮熱瘧泄。客氣加臨。營衛不和。經阻有諸。但食薑氣味  
過辛致病。辛則泄肺氣。助肝之用。醫者知此理否耶。夫  
診脉右弦數。微寒熱。渴飲。擬從溫治。上焦氣分。以表暑  
風之邪。用桂枝白虎湯。

王三歲暑風入肺。煩熱咳嗽。防驚。

益元散

黃芩

竹葉

花粉

苡仁

地骨皮

張五形瘦脉數。驟涼暮熱。肺失和為咳。小暑後得之。亦由  
時令暑濕之氣。輕則治上。大忌發散。

大竹葉

飛滑石

杏仁

花粉

桑葉 生甘草

某 咳嗽喉痛。溺瀉。

西瓜翠衣三錢 杏仁三錢 六一散三錢 桔梗一錢

通草一錢 桑葉一錢 川貝一錢 連翹一錢

曹 水穀不運。濕聚氣阻。先見喘咳。必延蔓腫脹。治在氣分。

杏仁 厚朴 苡仁 廣皮白

蘇梗 白通草

陸 濕必化熱。薰蒸為嗽。氣隧未清。納穀不旺。必薄味靜養。壯盛不致延損。

飛滑石

南花粉

象貝

苡仁

萊豆皮

通草

某渴飲咳甚大便不爽

石膏

花粉

通草

紫苑

木防已

杏仁

苡仁

濕痰阻氣

某

雨濕寒熱汗出痰多咳嗽大小便不爽胸脘不飢臍

左室塞

杏仁

萊菔子

白芥子

蘇子

鬱金

薑皮

通草

橘紅

朱十五中虛少運濕痰多阻氣分咳嗽舌白

火 濕熱

炒牛夏 茯苓 桂枝木 炙草 苡仁

馮 脉右弦大而緩形瘦目黃久嗽聲嘶而濁水穀氣蘊之濕再加時序之濕熱壅阻氣分咳不能已久成老年痰火咳嗽無性命之憂有終年之累

蘆根 馬勃 苡仁 浙茯苓

川斛 通草

陳 秋燥痰嗽氣促

桑葉 玉竹 沙參 嘉定花粉

苡仁 甘草 蔗漿

又 用清燥法



桑葉

玉竹

沙參

苡仁

甘草

石膏

杏仁

施脉沉弦爲飲。近加秋燥。上咳氣逆。中焦似痞。姑以辛

泄涼劑。暫解上燥。

括蘘皮

鬱金

香豉

杏仁

苡仁

橘紅

北沙參

山梔

胡六脉右勁。因疥瘡頻以熱湯沐浴。衛疎易傷。冷熱皮毛

內應乎肺。咳嗽氣塞痰多。久則食不甘。便燥結。胃津日耗。不司供肺。况秋冬天降燥氣。上加漸至老年痰火之象。此清氣熱以潤燥。理勢宜然。倘畏虛日投滯補益。弊

枯燥矣。

霜桑葉

甜杏仁

麥冬

玉竹

白沙參

天花粉

甘蔗漿

甜梨汁

熬膏

其四 脈弦胸膈痺痛咳嗽頭脹此燥氣上侵肺氣不宣使然當用輕藥以清上焦

枇杷葉

桑葉

川貝

杏仁

冬瓜子

桔梗

其九 舌白咳嗽耳脹口乾此燥熱上鬱肺氣不宣使然當用辛涼宜薄滋味

鮮荷葉

錢三

連翹殼

牛一錢

大杏仁

錢三

白沙參

錢一

飛滑石

錢二

冬桑葉

錢一

某二邪燠肺陰咳嗽咽痛。補甚。

玉竹

南沙參

冬桑葉

川斛

玄參

青蘘漿

某二鼻淵三載。藥投辛散。如水投石。未能却除。辛辣炙燂

耳。近復咳嗽音嘶。燥氣上逼肺衛使然。

杏仁

連翹

象貝

白沙參

桑皮

玳鈴

僧三脉右寸獨大。氣分咳。有一月。

桑葉

杏仁

玉竹

苡仁

沙參

茯苓

糯米湯煎

某脉右大。寤咳寐安。病在氣分。

桑葉

川貝

知母

地骨皮

梨汁

蔗漿

熬膏

朱女肝陰虛。燥氣上薄。咳嗽夜熱。

桑葉

白沙參

杏仁

橘紅

花粉

地骨皮

糯米湯煎

陸女燥風外侵。肺衛不宣。咳嗽痰多。不時身熱。當用輕藥。

以清上焦。

桑葉

杏仁

花粉

大沙參

川貝

萊豆皮

戎咽阻咳。兩月來聲音漸低。按脉右堅。是冷熱傷肺。

生薑子白

桑葉

玉竹

沙參

麥冬

甜杏仁

吳七歲。燥氣上通。咳。以甘寒治氣分之燥。

大沙參

桑葉

玉竹

生甘草

甜梨皮

某十。燥熱內伏。發熱。咳嗽。口渴。

桑葉

杏仁

白沙參

蓮翹

圓圖滑石

鮮蘆根

費。久瘧傷陰。冬。季溫舒。陽不潛藏。春木升舉。陽更泄越。

入暮寒熱晨汗始解而頭痛口渴咳嗽陰液損傷陽愈熾冬春溫邪最忌發散謂非暴感汗則重劫陰傷迫成虛勞一途況有汗不痊豈是表病診得色消肉燥脉獨氣口空搏與脉左大屬外感有別更有見咳不已膠爲肺熱徒取清寒消痰降氣之屬必致胃損變重嘗考聖訓仲景云凡元氣已傷而病不愈者當與甘藥則知理陽氣當推建中顧陰液須投復脉乃邪少虛多之治法但幼科未讀其書焉得心究是耶然乎否乎

炙甘草

鮮生地

麥冬

火麻仁

阿膠

生白芍

青蔗漿

又由陰傷及胃。痿黃食少。餐法當補養胃陰。虛則補母

之治也。見咳治肺。生氣日憊矣。金匱麥門冬湯

某五脫痺咳嗽

鮮枇杷葉三錢 以壁杏仁三錢 桔梗一錢 川貝二錢

冬瓜子三錢 蜜炙橘紅一錢

周二秋燥從天而降。腎液無以上承。咳嗽吸不肯通。大便

三四日一更衣。脉見細小。議治在臟陰。

牛乳 紫衣胡桃 生白蜜 薑汁

吳久嗽因勞乏致傷。絡血易瘀。長夜熱灼。議養胃陰。

北沙參 黃芪皮 炒麥冬 生甘草

炒粳米 南棗

其 喉痺咳嗽。脉右大而長。

生扁豆 麥冬 北沙參 川斛 青蘘漿

毛 上年夏秋病傷。冬季不得復元。是春令地氣陽升。寒

熱咳嗽。乃陰弱體質。不耐升泄所致。徒謂風傷。是不知

陰陽之義。

北參 炒麥冬 炙甘草 白粳米 南棗

某二 病後咳嗽。當清養肺胃之陰。

生扁豆 麥冬 玉竹 炒黃川貝

川斛 白粳米湯煎



徐仁形寒畏風。食減久嗽。是衛外二氣已怯。內應乎胃。陽脉不用。用藥莫偏治寒熱。以甘藥調。宗仲景麥門冬湯法。

張七八夏嗽。緩神倦食減渴飲。此溫邪延久。津液受傷。夏令暴煖。泄氣胃汁暗虧。筋骨不束。兩足痠痛。法以甘緩益胃中之陰。做金匱麥門冬湯製膏。

麥冬

北沙參

生甘草

錢五

生扁豆

兩二

麥冬

南棗

熬膏

湯二脉左堅數促冬溫咳嗽。是水虧熱升。治不中欬。胃陰受傷。穢濁氣味直上咽喉。卽清肺冀緩其嗽。亦致氣泄。

而嗽仍未罷。先議甘涼益胃陰以制龍相。胃陰自立可商填下。

生扁豆 米炒麥冬 北沙參 生甘草

冬桑葉 青蘘漿

錢氏 脉右數。咳兩月。咽中乾。鼻氣熱。早暮甚。此右降不及。胃津虛。厥陽承襲。金匱麥門冬湯去半夏加北沙參。某<sup>十</sup>咳早甚。屬胃虛。

生扁豆 炒麥冬 大沙參 苡仁 橘紅

陳 秋冬形體日損。咳嗽吐痰。診脉兩寸促數。大便通而不爽。此有年煩勞動陽。不得天地收藏之令。日就其消。

乃虛症也。因少納胃衰。未可重進滋膩。議用甘味養胃  
陰一法。金匱麥門冬湯

錢 久咳三年。痰多食少。身動必息。鳴如喘。診脉左搏數。  
右小數。自覺內火燔燎。乃五液內耗。陽少制伏。非實火  
也。常以瓊玉膏滋水益氣。暫用湯藥。總以勿損胃爲止。  
治嗽肺藥。諒無益於體病。

北沙參

白扁豆

炒麥冬

茯神

川石斛

花粉

肺火犯  
范氏 兩寸脉大咳甚。腕悶頭脹。耳鼻竅閉。此少陽鬱熱上  
逆犯肺。肺燥喉癢。先擬解木火之鬱。

胃火形

羚羊角

連翹

梔皮

薄荷梗

苦丁茶

杏仁

薤皮

菊花葉

陸如

脉小久咳背寒骨熱知飢不食厭惡食物氣味此憂

思悵鬱皆屬內損閱方藥都以清寒治肺不應議益土

泄木法

炙甘草

茯神

冬桑葉

炒丹皮

炒白芍

南棗

尤氏

寡居煩勞脉石搏左濇氣燥在上血液暗虧由思鬱

致五志煩煎固非溫熱補濇之症晨咳吐涎姑從胃治

以血海亦隸陽明耳

生白扁豆

玉竹

大沙參

茯神

經霜桑葉 苡仁

用白糯米半升淘濾清入

滾水泡一沸取清湯煎藥

又

木虛在下情懷悵鬱則五志之陽上蒸為咳固非實

火但久鬱必氣結血滯延成乾血勞病經候澹少愆期

已屬明徵當培肝腎之陰以治本清養肺胃氣熱以理

標剛熱之補畏其劫陰非法也

生扁豆

一兩

北沙參

錢三

茯神

三錢

炙草

五分

南棗肉

三錢

凡

熟地

砂仁末拌

鹿角霜

另研

當歸

小茴香拌

一兩

淮牛膝

鹽水炒

雲茯苓

二兩

紫石英

醋煨水

飛

一兩

熱

分

青鹽 五錢

另熬生羊肉膠和丸早服四錢開水送

章二

自服八味鹿角膠以溫補反咳嗽吐痰形瘦減食皆

一偏之害宜清營熱勿事苦寒

鮮生地

麥冬

玄參心

甘草

苦百合

竹葉心

某七脉數衝氣咳逆當用攝納腎陰滋養柔金爲金水同

治之法

熟地 四錢

白扁豆 五錢

北沙參 三錢

麥冬 二錢

川斛 三錢

茯神 三錢

王八脉左尺堅久嗽失音入夏見紅天明咳甚而納穀減

臨證指南醫案

卷二

咳嗽

六

損此勞損之症。急宜靜養者。

麥冬

大沙參

玉竹

川斛

生白扁豆

雞子白

某久嗽咽痛。入暮形寒。雖屬陰虧。形痿脉冥。未宜妄補。

麥冬

南沙參

川斛

生甘草

糯稻根鬚

某氣急咳頻欲嘔。下午火升。此上有燥熱。下焦陰虧也。

早都氣丸

晚威喜丸

張今年春季時疫。大半皆有咳嗽咽喉之患。乃邪自上干。肺氣先傷耳。近日身動氣喘。聲音漸不揚。着左眠臥。左脇上有牽掣之狀。此肝腎陰虧。衝氣上觸。冬藏失司。

漸有創見音障至矣勞傷致損非清邪治咳之病

六味丸加陽秋右阿膠麥冬蜜丸

頤 真陰不旺先後天皆虧以填精實下爲主若清熱冀  
圖治嗽必胃損減穀

熟地

萸肉

山藥

茯苓

湖蓮

天實

五味

人乳粉

金櫻膏丸

湯三脈左弱右搏久有虛損交春不復夜卧着枕氣衝咳  
甚卽行走亦氣難喘促此乃下元根蒂已薄冬藏不固  
春升生氣淺少急當固納攝下世俗每以辛涼理嗽每  
致不救矣



水製熟地

五味

胡蓮

芡實

伏龍

青鹽

羊內腎

其氣衝咳逆行動頭脹下體自汗 都氣丸

藥九熱病兩三反覆其陰必傷當戊亥時厥昏汗出者乃

虛陽上冒非腎根蒂不牢衝氣震動則諸脈俱逆陽泄

爲汗耳此咳嗽乃下焦陰不上承非肺病也急當收攝

固刺腎蘇子鈎藤皆泄氣鉅甚之藥施於陰陽兩損

之腎最宜斟酌 都氣加青鉛

朱五吸氣息音行動氣喘此咳嗽是腎虛氣不收攝形寒

怯冷護衛陽微腎氣丸頗適形氣不足加人參河車

王十五氣急嗽逆足冷當用攝納水中藏火法 薛氏加減

八味丸三錢淡煎湯送下

郭二形瘦脉垂尺澤久嗽嘔逆半年不愈是腎虛厥氣上干醫藥清寒治肺者不少誤人匪淺

坎炁 人乳粉 杞子 五味 胡桃肉

茯神 巴戟肉 萸肉 山藥漿丸

某二冬季咳嗽吐痰漸至卧則氣衝喘急起坐今三載矣經以肺腎爲俯仰之臟是肺主出氣腎主納氣老年患此按脉右弦左沉爲腎氣不收主治不必因痔患而畏辛熱 腎氣丸去牛膝肉桂加沉香蜜丸

張十三冬季喘嗽似屬外因表散杏進反致失音不得着枕  
卧眠今戌亥時濁陰上千而喘急氣逆爲甚仍議引導  
納氣歸腎 六味加附子車前補骨脂胡桃沉香  
朱 虛勞食減便瀉已無清肺治嗽之法必使胃口旺冀  
其久延此非藥餌可效之病

人參

秋石泡湯拌烘

茯神

山藥

建蓮

炙實

以仁

訶子皮

用糯稻根鬚煎湯煎藥

沈九勞嗽食減便瀉汁出陰損已及陽腑中宜扶胃下固  
腎陰爲治大忌清肺寒涼希冀治嗽

熟地

熟冬朮

五味

炙實

湖蓮

山藥

某氣弱久嗽痰多午前爲甚

早服都氣丸三錢 午服異功散

某久咳損及中州脾失輸化食減神倦肺無所資至咳不已診得兩手脉弦細數精氣內損非泛常治咳消痰所可投

熟地

阿膠

燕窩

海參

天冬

茯苓

紫石英

紫衣胡桃肉

陰虛火

孫脈搏大陽不下伏咳頻喉痺暮夜爲甚先從上治

生雞子白

生扁豆皮

玉竹

白沙參

麥冬

地骨皮

周四八脉來虛花形色衰奪久患漏瘍陰不固攝經營勞動陽氣再傷冬月客邪致咳都是本體先虛春深入夏天地氣泄身中無藏日加萎頓理固當然此豈治咳治血者議補三陰臟陰方法

人參

秋石湯拌

熟地

麥冬

扁豆

茯神

白粳米

施氏

脉細數乾咳咽燥脊痠痿弱此本病欲損

阿膠

雞子黃

北沙參

麥冬

茯神

小黑稽豆皮

某 左豚弦數遺泄久嗽痰黃當用填補

炒熟地

芡實

扁豆

女貞

茯神

糯稻根鬚

野合  
陰虛

丁六秋令天氣下降上焦先受燥化其欬症最多屢進肺藥無功按經云久咳不已則三焦受之是不端於理肺可知矣六旬又三形體雖充而真氣漸衰古人於有年久嗽都從脾腎子母相生主治更有欬久氣多發泄亦必益氣甘補歟攝實至理也茲議攝納下焦於早服而純甘清燥暮進填實在下清肅在上凡藥味苦辛宜忌為陽胃泄氣預防也

服早

水製熟地八兩

白雲苓乳蒸四兩

五味子去核蒸三兩

建蓮去心衣三兩

淮山藥乳蒸四兩

車前子三兩

淮牛膝熬水拌蒸三兩

紫衣胡桃肉霜連紫皮三兩

右為末用蒸熟猪脊髓去膜搗丸服六七錢開水送

晚用益胃土以生金方注

真北沙參有根有鬚者四兩

生黃芪薄皮三兩 麥冬去心二兩

生白扁豆國圖連皮四兩

生細甘草一兩 南棗肉四兩

淡水煎汁濾清收膏臨成加真柿霜二兩收晚土開

水化服五錢

中氣虛

徐八色萎脉濡心悸岩痰咳逆勞心經營氣餒陽虛中平

向哀病加治法中宮理胃下固腎真務以加穀爲安纒  
治非宜煎藥用大半夏湯早服附都氣丸

某色白肌柔氣分不足風溫上受而咳病固輕淺無如  
羌防辛溫膏知沉寒藥重已過病所陽傷背寒胃傷減  
穀病志仍若身體先憊問誰之過歟 小建中湯

又苦辛泄肺損胃建中得安宗內經辛走氣以甘緩  
其急然風溫客氣皆從火化是清養胃陰使津液得以  
上供斯燥癢咳喘自緩土旺生金虛則補母古有然矣

金匱麥門冬湯

王亂藥雜投胃口先傷已經減食便溏何暇紛紛治嗽



急急照顧身體久病宜調寢食 異功去白朮加炒白芍炒山藥

高 甘藥應驗非治嗽而嗽減病根不在上腹鳴便忽澹陰中之陽損傷

人參

冬白朮

雲茯苓

炙甘草

炒白芍

南棗

徐六勞損咳嗽用建中法得效乃無形之氣受傷故益氣之藥氣醇味甘中土寧金受益然必安穀加餐庶幾可禦長夏濕熱蒸逼真氣致泄反覆 異功加歸芪薑棗其 內損虛症經年不復色消奪畏風怯少營衛二氣已

乏納穀不肯充長肌肉法當建立中宮大忌清寒理肺  
希冀止嗽嗽不能止必致胃敗減食致劇

黃芪建中湯去薑

陳仁脈細促久嗽寒熱身痛汗出由精傷及胃

黃芪建中湯去薑

許仁久嗽不已則三焦受之一年來病咳而氣急脈得虛  
數不是外寒束肺內熱迫肺之喘急矣蓋飯弱無以自  
立短氣少氣皆氣機不相接續既曰虛症虛則補其母

黃芪建中湯

李三久嗽經年背寒足跗常冷汗多色白嗽甚不得卧此

陽微衛薄外邪易觸而濁陰挾飲上犯。議和營衛兼護其陽。黃芪建中湯去飴糖加附子茯苓。

任五勞力傷陽。自春至夏病加煩倦神羸不食。豈是嘔藥可醫。內經有勞者溫之之訓。東垣有甘溫益氣之方。堪爲定法。歸芪建中湯。

張二九節課誦讀動心耗氣。凡心營肺衛受傷。上病延中。必漸減食。當世治咳。無非散邪清熱。皆非內損主治法。

歸芪建中湯去薑

呂 脈左細右空搏。久欬吸短如喘。肌熱日瘦。爲內損怯症。但食納已少。大便亦澀。寒涼滋潤未能治嗽。徒令傷

脾妨胃苦越人謂上損過脾下損及胃皆屬難治之例  
自云背寒忽熱且理心營肺循仲景所云元氣受損甘  
藥調之二十日議建中法 黃芪建中去薑

馬 虛損脉弦久嗽食減 小建中去薑

傷 脉來虛弱久嗽形瘦食減汗出吸短久虛不復謂之  
損宗內經形不足溫養其氣 黃芪建中湯去薑加人  
參五味

某 脉弦右大久嗽背寒盜汗 小建中去薑加茯神  
朱 九五年咳嗽遇風冷咳甚 是肌表衛陽疎豁議固劑緩  
其急 黃芪建中湯

吳三勞力肺痿遇風則咳此乃衛陽受傷宜和經脈之氣  
勿用逐瘀攻傷之藥 當歸桂枝湯合玉屏風散

某久咳神衰肉消是因勞內傷醫投苦寒沉降致氣泄  
汗淋液耗夜熱胃口傷殘食物頓減 黃芪建中去薑

某脾胃脉部獨大飲食少進不喜飲水痰多咳頻是土  
衰不生金氣 建中去飴加茯神 按服四君子湯

某風溫咳嗽多勞氣分不充戊巳湯

人參

茯苓

於朮

炙草

廣皮

炒白芍

某勞嗽喜得辛煖之物 異功加懷香南棗

吳如病去五六當調寢食於醫藥之先此平素體實不可  
不論自來納穀恒少大便三日一行胃氣最薄而滋膩  
味厚藥憤商從來久病後天脾胃為要咳嗽 非各症  
治脾胃者土旺以生金不必窮究其嗽

人參

鮮蓮子

新會皮

茯神

炒麥冬

生穀芽

某

脉虛久嗽減食

四君子加南棗

勞倦  
虛

汗

初咳不得卧今左脈咳甚並不口渴欲飲周身熱熱

汗出此積勞內傷未反乘金不飢不納滋膩難投惟以  
培中土制木生金合乎內傷治法

川桂枝

茯苓

淡乾薑

五味子

生甘草

大棗

某二 咳逆欲嘔是胃欬也當用甘藥

生扁豆

一兩

北沙參

一錢

麥冬

米泔炒

茯苓

三錢

南棗

三錢

糯稻根

五錢

某 伏邪久咳胃虛嘔食殆內經所謂胃咳之狀耶

麻黃

杏仁

甘草

石膏

牛夏

苡仁

王二 脉沉短氣咳甚嘔吐飲食便溏泄乃寒濕鬱痺漬陽

明胃營衛不和胸痺如悶無非陽不旋運夜陰用事濁

肝  
肺

泛嘔吐矣。庸醫治痰氣治肺論咳不思內經胃咳之  
狀咳逆而嘔耶。小半夏湯加薑汁。

石 氣左升腹膨嘔吐涎沫黃太吞酸暴咳不已是肝逆  
乘胃射肺致坐不得臥。安胃丸三錢。

范 如 久咳涎沫欲嘔長夏反加寒熱不思食病起嗔怒氣  
暴上衝不能着枕顯然肝逆犯胃冲肺此皆疎泄失司  
爲勞勞之症故滋膩甘藥下咽欲嘔矣。

小青龍去麻辛甘加石膏

顏 氏 久有病經氣血不甚流暢驟加暴怒肝陽逆行乘肺  
則咳病家云少腹衝氣主于其咳乃作則知清潤肺藥



非中竅之法。今寒熱之餘。咳不聲揚。但脇中拘急。不飢不納。乃左升右降。不司旋轉。而胃中遂失下行。為順之。旨古人以肝病易於犯胃。然則肝用宜泄。胃腑宜通。為定例矣。

桑葉

丹皮

鉤藤

茯苓

牛夏

廣皮

威喜丸

三錢

大腸

其脉弦右甚。嗽午潮熱。便溏畏風。以大腸嗽治之。

生於朮

中

茯苓

三錢

赤石脂

錢

禹糧石

二錢

薑汁

四升

大棗

三枚

又照前方加白芍炙甘草

又麻數右長左弦上咳下瀉

生於朮牛 茯苓三錢 炙甘草五分 木瓜一錢

薑汁四分 大棗肉四錢

石四咳嗽十月醫從肺治無效而齟齬喉痺尻痛顯是厥陽肝風議鎮補和陽熄風

生牡蠣 阿膠 青黛 淡菜

某昨議上焦肺病百日未痊形肌消瘦悉由熱化久熱無有不傷陰液擬鹹補如阿膠雞子黃複入苓連苦寒自上清氣熱以補下雖為暫服之方原非峻尅之劑細思手經之病原無遠入足經之理但人身氣機合乎天

地自然肺氣從右而降肝氣由左而升肺病主降口遲  
肝橫司升日速咳噎未已乃肝勝木反刑金之兆試言  
及久寐寤醒左常似閃爍嘈雜如飢及至進食未覺胃  
中安適此肝陽化風旋擾不息致噎無平期卽候熱之  
來升至左頰其左升太過足爲明驗倘升之不已入春  
肝木司權防有失血之累故左右爲陰陽之道路陰陽  
既造其偏以致病所以清寒滋陰不能驟其速功

阿膠

雞子黃

生地

天冬

女貞實

糯稻根鬚

桃

腸痛久嗽

旋覆花湯加桃仁柏子仁

某 寒熱右脇痛咳嗽

蘆根

一兩

杏仁

三錢

冬瓜子

三錢

苡仁

三錢

枇杷葉

三錢

白蔻仁

三分

咳爲氣逆。嗽爲有痰。內傷外感之因甚多。確不離乎肺臟爲患也。若因於風者。辛平解之。因於寒者。辛溫散之。因於暑者。爲薰蒸之氣。清肅必傷。當與微辛微涼。苦降淡滲。俾上焦蒙昧之邪。下移出腑而後已。若因於濕者。有兼風兼寒兼熱之不同。大抵以理肺治胃爲主。若因秋燥。則嘉言喻氏之議最精。若因於火者。卽溫熱之邪。亦以甘寒爲主。但溫熱猶有用苦辛。

之法。非比秋燥而絕不用之也。至於內因爲病。不可  
不逐一分之有剛亢之威。木扣而金鳴者。當清金制  
木。佐以柔肝入絡。若土虛而不生金。眞氣無所稟攝  
者。有甘涼甘溫二法。合乎陰土陽土以配剛柔爲用  
也。又因水虛而痰泛。元海竭而諸氣上冲者。則有金  
水雙收。陰陽並補之治。或大劑滋填鎮攝。葆固先天  
一炁元精。至於飲邪竊發。亦能致嗽。另有耑門兼參  
可也。以上諸法。皆先生臨證權衡之治。非具慧心手  
眼。能如是乎。邵新甫

寒邪

風溫

# 吐血

朱 形寒暮熱。咳嗽震動。頭中腕中脇骨皆痛。先經嗽紅。  
 體氣先虛。此時序冷熱不勻。夾帶寒邪致病。脈得寸口  
 獨大。當清解上焦。大忌溫散之劑。

桑葉

蘇梗

杏仁

象貝

玉竹

大沙參

某

風溫上受吐血

桑葉

薄荷

杏仁

連翹

石膏

生甘草

徐陰虛風溫氣逆嗽血

生扁豆

玉竹

白沙參

茯苓

桑葉

鬱金

頤四寸口脈搏指而勁。痰血能食。初因風溫咳嗽。震動絡血。以清心營肺衛之熱。

小生地

黑山梔

地骨皮

天花粉

丹參

連翹

竹葉心

注右脈大咽喉痒澀。頭中微脹。此冬溫內侵。陽氣不伏。

絡熱。血得外溢。當調其復邪。

桑葉

山梔皮

連翹

白沙參

象貝 牛蒡子

某 脉小而勁。少年體豐。真氣易泄。經月咳。自非外感。因冬溫失藏。咳頻震絡。痰帶血出。當薄味以和上焦氣。熱得清。病患可却。

桑葉 山梔 杏仁 鬱金

象貝 花粉 糯米湯代水

溫熱  
王三五 脉右大。溫邪震絡。咳痰帶血。

桑皮 杏仁 山梔皮 花粉

大沙參 石膏

高 溫邪上鬱。清空目赤。頭脹。咳。嗆見血。此屬客病。不必



爲內損法

連翹

黑山梔

草決明

桑葉

薄荷梗

荷葉邊

苦丁茶

花粉

藥用急火煎

唐二血後。喉燥痒欲噎。脉左搏堅。

玉竹

南花粉

大沙參

川斛

桑葉

糯米飲煎

高。脉小。瀉欲涼飲。熱阻氣升血胃。仍議治上。

嫩竹葉

飛滑石

山梔皮

鬱金汁

杏仁汁

新荷葉汁

某春溫嗽痰。固屬時邪。然氣質有厚薄。不可槩以辛散。

汪七 天明至午嗽甚痰血春暖陽浮是腎虛不藏聞咳音重濁不爽先議輕清治氣分之熱

桑葉

南花粉

黑梔皮

桔梗

甘草

橘紅

某 脉搏數舌心灰咳嗽有血頻嘔絡傷致血隨熱氣上出仍理氣分

桑葉

花粉

苡仁

川貝

黃芩

茯苓

方 夏熱泄氣胃弱衝逆失血

扁豆

茯苓

參三七

茜草

施 脉小數。舌絳。喉中痒。咳咯血。因暑熱旬日。熱入營。震動而溢。凡肺病爲手太陰經。逆傳必及膈中。仍以手厥陰治。

竹葉心

生地

銀花

連翹心

玄參

赤豆皮

高 脉數。汗出身熱。吐血五日。胸脘不舒。舌色白。此陰虛本質。暑熱內侵營絡。漸有時瘧之狀。小溲莖中微痛。宜通腑經爲宜。

鮮生地

連翹

替金汁

滑石

竹葉

甘草稍

熟

且正在知識發動之年。陰分自不足。以至咳嗽失血。當以甘寒潤降。以肅肺金。

鮮枇杷葉 甜杏仁 南沙參 川貝

甜水梨 甘蔗漿

郭 熱傷元氣。血後咳逆。舌赤。脉寸大。

鮮生地 麥冬 玉竹 地骨皮

川斛 竹葉心

又 心眩。不饑。熱灼氣升。

鮮生地 玄參 丹參 鬱金汁

銀花 竹葉心 紫豆皮

八執機  
肺

某 脉滿咳嗽痰血不時寒熱此邪阻肺衛所致

葦莖湯加杏仁通草

孫二 用力氣逆血亂咳出腥痰濁血用千金葦莖湯

某 邪鬱熱壅咳吐膿血音啞

麻杏甘膏湯加桔梗苡仁桃仁紫苑

上焦氣  
分

倪二 肛瘍潰膿雖愈陰氣已經走泄當陽氣弛張發泄今

加嗽血痰多胃納減於平昔脉數促喘逆腕悶姑清肅

上焦氣分

蘇子

杏仁

香豉

黑梔皮

鬱金

蕤皮

降香

桔梗

又氣阻不餓

黑梔皮

香豉

藁皮

鬱金

杏仁

橘紅

王氏

入夏陰血乃氣泄陽升。幸喜經水仍來。大體猶可無妨。

近日頭脹。腕中悶。上午煩倦。是秋暑上受。防發寒熱。

竹葉

飛滑石

杏仁

連翹

黃芩

荷葉汁

暑熱鬱  
肺阻竅

江

積瘀在絡。動絡血逆。今年六月初。時令暴熱。熱氣吸

入首先犯肺。氣熱血湧。強降其血。血藥皆屬呆滯。而清  
空熱氣。仍蒙閉於頭髓空靈之所。諸竅痺塞。鼻窒瘰肉。

出納之氣都從口出。顯然肺氣鬱蒸。致腦髓熱蒸。脂液自下。古稱燥物消物莫如火。但清寒直泄中下。清空之病仍然。議以氣分輕揚無取外散。而事內通。醫工遇此法則每每忽而失察。

連翹

牛蒡子

通草

桑葉

鮮荷葉汁

青菊花葉

臨服入生石膏末煎一沸

火氣通

某三以毒藥燠瘡。火氣逼射肺金。遂令咳嗽痰血。咽乾胸

悶。診脉尺浮下焦陰氣不藏。最慮病延及下。即有虛損之患。姑以輕藥暫清上焦以解火氣。

杏仁 三錢

萊菔皮 二錢

冬瓜子 三錢

苡仁 三錢

木火升  
逆擾動  
陽絡

川貝一錢半 兜鈴七分

趙三 咳逆自左而上血亦隨之先以少陽胆絡治

生地 升皮 澤蘭 茯苓

降香末 荷葉汁

張三 六耳目昏蒙甚於午前此屬少陽鬱勃之升嘔惡痰血多是絡熱治以開泄莫投滋膩

桑葉 丹皮 黑梔 連翹

菊葉 萸皮 川貝 橘紅

董七 色蒼能食腕有積氣兩年秋冬曾有咯血此非虛損出乎體稟木火噴怒拂逆肝胆相火擾動陽絡故也



金斛

山梔

礞石

丹參

川貝

蘇子

鉤藤

茯苓

又接用清氣熱安血絡方。

生地

麥冬

玄參

知母

花粉

百部

桔梗

川貝

蜜丸

嚴四脉數。瀉小結。痰血經年屢發。仍能納食應酬。此非精血損怯。由乎五志過動。相火內寄肝胆。操持鬱勃。皆合動灼。致絡血上滲。混痰火。必靜養數月方安。否則木火劫燥。胃傷減食。病由是日加矣。

丹皮

薄荷梗

菊花葉

黑梔

淡黃芩

生白芍

鬱金

川貝

類 入夏陽升疾走驚惶更令諸氣益升飲酒多食櫻桃

皆辛熱甘辣絡中血沸上出議消酒毒和陽

生地

阿膠

麥冬

嘉定花粉

川斛

小黑稽豆皮

沈 脉左堅上透是腎病血色紫乃既離絡中之色非

久瘀也勞役暑蒸內陰不生有諸倣瓊玉意仍是陰柔

之通劑

鮮生地

人參

茯苓

琥珀末

張 血止脉左大

臨證指南醫案 卷二 吐血

美

天冬

生地

人參

茯神

炙草

生白芍

女貞

旱蓮草

顧

二脉左堅。陰傷失血致咳。

復脉去參桂姜加白芍

凡咳血之脉。右堅者。治在氣分。係震動胃絡所致。宜

薄味調養胃陰。如生扁豆。茯神。北沙參。苡仁等類。左

堅者。乃足腎陰傷所致。宜地黃。阿膠。枸杞。五味等類。

脉弦脇痛者。宜蘇子。桃仁。降香。鬱金等類。痰涎盈碗。

者。葛可久。花蕊石散。仲景大黃黃連瀉心湯一症而

條分縷晰。從此再加分別。則臨症有據矣。

趙四

虛不肯復。謂之損。納食不充。肌膚所脫。不能着左。遇

節令痰必帶血。脉左細右勁數。是從肝腎精血之傷。延及氣分。倘能節勞安逸。僅堪帶病。永年損症。五六年無攻病之理。臟屬陰。議平補足三陰法。

人參

山藥

熟地

天冬

五味

女貞

張四失血五六年。脉虛氣喘。不運不饑。治在中下二焦。望其安穀精生。勿許攻病爲上。

人參

炙草

白芍

茯神

炒熟地

五味

某七勞力血復來。衝氣咳逆。當用攝納爲要。

熟地 四錢

參三七 錢

大淡菜 一兩

牛膝炭 一錢

川椒 三錢

茯神 三錢

某四 脉弦脇痛已緩血仍來

大淡菜 一兩

參三七 錢

牛膝炭 一兩

錢 茯苓 二錢

川斛 三錢

小黑稽豆皮 三錢

某四 失血後咳嗽咽痛音啞少陰已虧耗藥不易治

糯稻根鬚 一兩

生扁豆 五錢

麥冬 三錢

川斛 一錢

北沙參 一錢

茯神 半錢

早服都氣丸淡鹽湯下

某三 脉虛數失血心悸頭眩

大淡菜 五錢

牛膝炭 一兩

白扁豆 一兩

白茯苓 三錢

藕節三錢 糯米根鬚九錢

某四九血來稍緩。猶能撐持步履。乃稟賦強健者。且能納穀。

陽明未敗可驗。而脉象細濇。陰傷奚疑。

北沙參一錢 扁豆一兩 參二七半 炒麥冬一錢

扶神三錢 川斛三錢

施二二。陰血數發。是陽氣過動。診脉已非實熱。夏至一陰來。

復。預宜靜養。迨其生氣。秋分後再議。生脉六味去丹。

澤加阿膠。秋石蜜丸。

張。脉右弦數。左細濇。陰損失血。後久咳。食減便溏。

熟地炭 扶神 建蓮 五味

芡實

炒山藥

某<sup>四</sup>失音咽痛。繼而嗽血。脉來濇數。已成勞怯。幸賴能食。胃強。勿見咳治咳。庶幾帶病延年。

細生地

錢三

玄參心

錢一

麥冬

半錢

細川斛

錢三

鮮蓮子肉

兩一

糯稻根鬚

錢五

沙<sup>三</sup>陰虛。血後痰嗽。必胃強加穀者。陰藥可以效靈。形羸食少。滋膩久用。必更反胃。靜養望其漸復。

熟地炭

萸肉

五味

川斛

茯神

芡實

建蓮

山藥

馬<sup>五</sup>

脉左堅右弱。木火易燃。營液久耗。中年春季失血嗽。

痰由情志鬱勃致傷抑且少食延壽古語謂瘦人之病  
慮虛其陰

生地

阿膠

北沙參

麥冬

茯神

川斛

某女  
脈左數側眠嗽血

生地

阿膠

麥冬

淡菜

生白芍

炙草

脈細左小促乾咳有血寒熱身痛經水先期漸漸色  
淡且少此虛陰傷及肝陽奇脈無氣內損成勞藥難驟  
效



生地

阿膠

牡蠣

炙草

麥冬

南棗

盧氏

沉着濃厚。肝腎之血。

熟地炭

炒杞子

炒歸身

牛膝炭

茯神

青鉛

砂仁末

又

照前方去牛膝青鉛加桂圓肉天冬

膠二

勞傷血後咳夜熱食少

清骨散加生地

耿三

久損交節血溢

青鉛六味去萸加炒牛膝川斛冲

熱重便服

某

脈細弦數陰分不足痰中帶紅腸風春溫之後再劫

津液以致上下失血風淫於內宜散寒

生地炭

阿膠

龜膠

玄參

白芍

女貞

茯苓

稽豆皮

升

陶二下虛陽動失血六味去丹澤加阿膠淡菜

陳日來寒暄不勻煩勞陽升咳哈震動絡血上沸診脉

左數五心熱知饑納穀議育陰和陽方法

生地

清阿膠

天冬

麥冬

扶神

川斛

炒牛膝

青鉛

童便

陳五形瘦脉促數吸氣如喘痰氣自下上升此屬腎虛氣

不收攝失血後有此乃勞怯難愈大症用貞元飲

鄒一內傷驚恐肝腎臟陰日損陽浮引陰血以胃上竅二氣不交日加寒熱骨熱咽乾不寐陰分虛其熱甚於夜

阿膠雞子黃湯

沈勞動陽升血自左溢

阿膠

參三七

甜北沙參 茯神

生白扁豆 炒麥冬

江二少壯情志未堅陰火易動遺精淋瀝有諸腎水既失其固春木地氣上升遂痰中帶血入夏暨秋胃納不減後天生旺頗好不致勞怯之憂但酒色無病宜節有病宜絕經年之內屏絕必得却病

熟地 水製 萸肉

山藥

茯神

湖蓮

遠志

五味

黃柏

芡實

金櫻膏丸

陸十 知識太早。真陰未充。龍火易動。陰精自泄。痰吐帶血。津液被燥。幸胃納安穀。保養少動宜靜。固陰和陽可痊。

熟地 水製 萸肉

山藥

茯苓

芡實

遠志

五味

煅牡蠣

白蓮鬚

蜜丸

徐二 心腎精血不安。火風陽氣熾。失血眩暈。心悸溺精。若過用心作勞。不能復元矣。

熟地

萸肉

山藥

茯神

芡實

遠志

建蓮

五味

海參膠

彭十陰虛有遺痰嗽有血。誦讀久坐陽升。

桑葉

生扁豆

北沙參

麥冬

霍山石斛

生甘草

苡仁

茯苓

吳二失血在五年前。咳頻嘔噦。氣自上衝逆。乃下元精血之虛。非外邪寒熱之咳。痰出腥氣。亦從下出。節慾勿勞力。胃壯可免勞怯。都氣丸。

周二左脉弦數。失血後。咳嗽音嘶少寐。陰虧陽升不潛之候。當滋養爲主。

生地炭

錢三

生牡蠣

錢五

阿膠

半錢

麥冬

半錢

茯神

錢三

川斛

錢三

周<sup>三</sup> 屢屢失血。飲食如故。形瘦面赤。稟質木火。陰不配陽。  
據說服桂枝治外感。卽得此恙。凡辛溫氣味宜戒。可以  
無妨。六味加阿膠龜甲天冬麥冬。

孫<sup>三</sup> 形瘦脈數寸口搏指。浮陽易動上冒。都屬陰精不旺。  
幸胃納尚佳。數發不致困頓。然須戒酒淡慾。怡情靜養。  
水足火不妄動。絡血自必寧靜矣。六味加龜甲秋石。  
趙<sup>八</sup> 屢遭客熱傷陰。逢夏氣泄吐血。下午火升咳嗽。液虧。  
陰火自灼。胃口尚健。安閑絕慾可安。

熟地

萸肉

龜甲

淡萊膠

五味

山藥

茯苓

建蓮

蜜丸

某內經分上下失血爲陰絡陽絡。是腑絡取胃臟絡論脾。今飲食甚少。柔脆姑緩。上下交病。治在中焦。其午火升煩嗽。亦因血去陰傷。以胃藥從中鎮補。使生氣自充也。

人參

茯苓

白朮

炙草

扁豆

白芍

山藥

又因觸脇氣悶。絡血復上。過戌亥時自緩。早上診脈。細促無神。左目珠痛。假寐喉息。有音足脛冰冷。皆血胃不已。孤陽上升。從肝腎引陽下納法。

人參

熟地炭

炒杞子

茯苓

淡菜

炒牛膝

四服

又每下午戌亥少陰厥陰龍相上越絡中之血隨氣火上升考五行之中無形有聲莫如風火此皆情志之變動必須陽潛陰固方免反覆也

人參

河車膠

大熟地

五味

炒杞子

茯苓

炒牛膝

倘陰逆有聲加青鉛喉痒痛加阿膠秋石火升用秋石湯煎藥加女貞子便秘加鹹菴蓉柏子仁血止幾日或涉思慮惱怒復有脇痛減食不甘乃少陽木火犯脾當泄胆益土用四君加丹皮桑葉



徐六脉左垂右弦陰精不足。胃納亦少。初冬痰中見紅。冬春寐有盜汗。難藏易泄。入夏當防病發。諸凡節勞安逸。經年可望安康。

熟地 阿膠 五味 萸肉 秋石

山藥 茯神 川斛 旱蓮草膏丸

又脉左細數。肉消肌燥。氣衝咳嗽。嘔吐失血。是肝腎內損。下元不主納氣。厥陽上冒所致。非肺咳矣。當交夏氣升血溢。姑以鎮納。望其血止。青鉛六味加牛膝白芍。又脉兩手已和。惟煩動恍惚欲暈。議靜藥益陰和陽。

三才湯加金箔

葉 講誦煩心。五志之陽皆燃。恰值芒種節。陰未來復。陽氣升騰。絡中血不寧靜。隨陽泄以外溢。午後上竅。煩熱陰不戀陽之徵。致頭中微痛。主以和陽鎮逆。

生地

阿膠

牛膝炭

生白芍

茯神

青鉛

杜<sub>二</sub>七<sub>七</sub> 脉小數。入尺澤。夏季時令發泄。失血形倦。治宜攝固下焦。

熟地

萸肉

山藥

茯神

建蓮

五味

芡實

線魚膠

金櫻膏丸

蘇<sub>三</sub>九<sub>九</sub> 脉左堅。冬令失血。能食而咳。脊痛腰痠。乃腎臟不固。

少納。腎脉虛餒。五液不承。寐則口乾。喉燥。宜固陰益氣。  
固本丸加阿膠。芡實。蓮肉丸。

潘二形色充偉。脉長關搏。述冬季。衄血痰血。交夏不病。蓋  
夏月藏陰。冬月藏陽。陽不潛伏。升則血溢。降則遺精。乃  
稟陽體。而性情喜動之累耳。

生地

熟地

天冬

麥冬

龜腹甲心 秋石

龍骨

遠志

梅九性情過動。失血。夫血貴寧靜。不宜踈動。踈動則有泛  
溢之虞。瘦人陽有餘。陰不足。補陰潛陽法。 補陰丸  
某十五脉數咳血。曾咯腥痰。若作肺癰。體質木火。因煩勞陽

升逼肺。肺熱不能生水。陰愈虧而陽愈熾。故血由陽而出也。當金水同治爲主。

熟地 四兩 生地 二兩 天冬 二兩 麥冬 二兩 茯神 二兩

龜版 三兩 海參膠 二兩 淡萊膠 二兩 川斛膏 四兩 女貞 一兩

北沙參 二兩 旱蓮草 一兩 膠膏丸

鄒二向有失血是真陰不旺。夏至陰生。伏天陽越於表。陰伏於裏。理宜然矣。無如心神易動。暗吸腎陰。絡脉聚血。陽觸乃溢。陰伏不固。隨陽奔騰。自述下有衝安逆氣。血湧如泉。蓋任脉爲擔任之職。失其擔任。衝陽上冲。莫制。皆腎精肝血不主內守。陽翔爲血溢。陽隆爲陰遺。腰痛

足脛畏冷何一非精奪下損現症。經言精不足者補之。以味藥味宜取質靜填補。重着歸下。莫見血以投涼。勿因嗽以理肺。若此治法。元海得以立基。衝陽不來犯上。然損非旬日可復。須寒暑更遷。凝然不動。自日逐安適。調攝未暇。縷悉也。

人參 三錢

熟地 炒熟成炭四錢

鮮河車膏 一錢

茯苓 一錢

炒黑枸杞子 一錢

北五味 一錢

沙苑 一錢

紫石英 五錢

血脫益氣用人參熟地兩儀煎方。謂人參同陰藥則補陰。茯苓入陽明。能引陰藥入於至陰之鄉。河車血

肉溫養同石英收鎮衝脉兼以包固大氣之散越五味酸收領其五液枸杞溫潤同沙苑之鬆靈入肝絡。參方中之藥應乎取味。况肝腎之病同一治也。

劉二脉左數八尺是真陰下虧。先有血症。畢姻後血復來。下干火升。陰中陽浮。保扶胃口以填陰。

阿膠

淡菜

生扁豆

麥冬

炙草

茯神

婁二思慮太過。心陽擾動。吸傷腎陰。時時並舉。此失血皆。嬌陽獨升。夜不得寐。歸家談笑怡情可安。

人中白

龜腹甲

知母

黃柏

錢 交夏陽氣大升。陰根失涵。火升血溢。必在晡刻。冲年  
大忌身心少持。必使陽和陰守爲要。

生地

阿膠

淡菜

牛膝炭

茯神

川斛

某 口氣腥臊。血色渾濁。下元無根。恐難接續。還元事已  
至急。與王先生同議攝陰陽法。

人參

川熟附

熟地

五味

炙草

青鉛

某 脉動極無序。血湧如泉。汗出畏冷。少焉熱躁。此無根  
之陽上冒。血凝成塊。非涼藥可止。

熟地炭

生龍骨

茯神

五味

薄桂

生白芍

鹽水炒牛膝

又

人參

生龍骨

熟地炭

茯神

炒杞子

五味

華二

陽動失血。皆係陰虧。如心悸咽乾咳嗽。都是陽浮上

亢。必久進填實。臟陰斯浮。越自和。面亮油光。皆下虛少

納。都氣加龜版人乳粉蜜丸

徐

陰根愈薄。陽越失交。初夏發泄。血湧吸短。心腹皆熱

豈止瀉之藥可療。益氣攝陰。乃據理治法。

人參

熟地

五味子



肝風

羅 上年脇痺已屬絡傷。今夏四月陽氣升發絡中血沸上溢陰分熱蒸下午乃甚。喉痒而噎心中嘈雜肝風內震顯然。

鮮生地

阿膠

丹參

鹽水炒牛膝

女貞子

川斛

童便

龔 咳嗽繼以失血。經言三焦皆傷。喉痛失音。乃陰液無以上承。厥陽燔燎不已。病深難於奏功。憑理而論。鎮胃制肝。乃和陽熄風之義。

淮小麥

南棗

阿膠

茯苓

北沙參

天冬

陸 脉數血後咳甚痰腥肢腫陽升內風鼓動最屬難治

生地 阿膠 天冬 麥冬

生白芍 茯神

沈 味進辛辣助熱之用致肺傷嗽甚其血震動不息陽

少潛伏而夜分爲甚清氣熱而不妨胃口甘寒是投與

內經辛苦急急食甘以緩之恰符

生甘草 玉竹 麥冬 川貝

沙參 桑葉

又 肝陽易逆內風欲湧不得着左臥惡辛氣喜甘潤治

肝體用潤劑和陽

生地

阿膠

天冬

茯神

牡蠣

小麥

羅九血去絡傷陽氣上蒸胸脇微痛非有形滯濁脉得左關前動躍如浮頭中微暈陽氣化風何疑

鮮生地

玄參心

麥冬

地骨皮

知母

川斛

又左脉形畧歛仍堅微暈喉燥脘痛熱蒸陽明津衰厥陰陽風自動而胃氣欲逆大便不爽是其明徵熄風和陽必用柔緩少佐宣暢脘氣亦暫進之法

鮮生地

麥冬

火麻仁

桑葉

鬱金

生香附汁

又復脈去參姜桂加白芍

血後傷  
氣上逆

某

血後氣衝形寒法當溫納

茯苓

三錢

粗桂枝

八分

炙草

五分

五味

七分

陰易並  
虛

何

早晨未進飲食咳逆自下焦上冲有欲嘔之象虛里

左脇呼吸牽引震動背部四肢寒冷入暮心腹熱灼而

舌上乾辣夫陽虛生外寒陰虛生內熱陽屬喘氣主乎

外衛陰屬臟真主乎內營由絡血大去新血未充穀味

精華不得四布知味容納而健運未能自然脇右少舒

全係胃絡下焦陰精損傷中焦胃陽不振夏至初陰不

主來復交節絡血再動。總是既損難以驟復之徵。大意下焦陰陽宜潛宜固。中焦營衛宜守宜行。用藥大旨如此。至於潛心滌慮。勿擾情志。再於子午叅以靜功。俾水火交陰陽偶。是藥餌已外工夫。皆培植生氣之助。

養營湯去黃芪遠志

又自服養營湯。溫補足三陰。臚法半月來。諸症皆減。惟午餘心腹中熱未罷。凡精血久損。理必質重味厚填納。空隙祇因中焦運納不旺。況長夏時令。熱最耗氣。議早進通陽守陰。晚用益中消暑。冀其生旺。非攻病也。

午服生脉散

服早

人參

熟地

杞子

當歸

茯苓

肉桂

扶神

五味

某婦操持拂鬱五志中陽動極失血暗咳有年皆緣性情內起之病草木難以奏安今形色與脉日現衰憊係乎生氣剋削慮春半以後地氣升陽氣泄久病傷損裡真少衆冬春入冷主藏總以攝補足三陰臟扶持帶病延年就是人工克盡矣

人參

炒白芍

熟地炭

五味

炙草

建蓮

陰陽馬

四閱病原是腎虛嗽血年分已久腎病延傳脾胃遂食

臨證指南醫案

卷二

吐血

辛

截腹膨病是老勞難以速功行走喘促元海無納氣之權莫以清寒理嗽急急收納根蒂久進可得其益

人參

人乳粉

坎炁

枸杞

沙苑

五味

茯苓

胡桃

宋

臟脉附背督脉行身之背是少陰真氣不攝唾中有

血吸氣少入而腰脊痠楚寐泄魄汗皆真氣內損若加

噴怒再動肝陽木火劫燥脂液春木日旺調之非易

水製熟地

蜜炙五味

女貞

茯神

川斛

炒山藥

次實

湖蓮

下虛當春升之令形質無力嗽血復來以甘溫厚味

表其陰中之陽

枸杞

沙苑

歸身炭

牛膝

巴戟

精羊肉

下損及

錢

一陽初萌血症即發下焦真氣久已失固亡血後飲

食漸減咳嗽則腕中引痛衝氣上逆乃下損及中。最難痊愈擬進攝納方法

人參

熟地

五味

茯神

川斛

紫衣胡桃

調人鮮河車膠

上七少年陰火氣升直降上則失血咳逆下墜肛瘍延漏皆虛勞見端食減至半胃關最要非可見熱投涼以血



嗽泥治

熟地炭

建蓮

霍石斛

茯神

炒山藥

芡實

某三診脉數濟咳血氣逆晨起必嗽得食漸緩的是陰損及陽而非六氣客邪可通可泄法當養胃之陰必得多納穀食乃治此損之要着

生扁

錢五

北沙參

錢一

麥冬

錢一

川斛

錢三

生甘草

分三

茯神

錢三

南棗肉

錢一

糯稻根鬚

錢五

鄭八虛損四五年肛漏未愈其咳嗽失血正如經言陰精不主上奉陽氣獨自升降奈何見血投涼治嗽理肺病

加反覆胃困減食夫精生於穀中土運納則二氣常存  
久病以寢食爲要不必汲汲於病

生黃芪 黃精 訶子肉 白芨 苡仁

兩煎 淡火熬膏不用蜜收畧飢用五錢參湯送

脾腎衰

某五 向衰之年夏四月時令陽氣發泄遇煩勞身中氣泄

絡血外溢臟液少涸遂痰嗽不已俗醫見嗽愈投清肺  
滋陰必不效驗此非少年情慾陰火之比必當屏煩戒  
勞早進都氣晚進歸脾平補臟真再用嗽藥必然胃減  
姜九自上年冬失血漸形減氣弱精血內損不肯再復延  
成勢怯填養精血務在有情庶幾不奪胃氣

腎胃衰

人參

鮮河車膠

水製熟地

五味

茯苓

山藥

芡實

黑殼建蓮

顧六失血。血形濃厚。必自下先傷胃。減無力。氣分亦損。此陰藥中。必兼扶胃。非沉滯清寒所宜。

人參

熟地

建蓮

芡實

山藥

茯苓

邵八脉堅形瘦久咳失血有年。食物厭惡。夜寢不適。固以培本爲要。所服七味八味湯九。乃肝腎從陰引陽法。服之不效。此液虧不受桂附之剛。當溫養攝納其下。兼與益胃津以供肺。

服晨

熟地

茯苓

杞子

五味

胡桃肉

牛膝

柏子仁

茯苓

蜜丸

服晚

人參

麥冬

五味

炙草

茯苓

鮮蓮子

山藥

胡

三

冬季失藏吐血。四月純陽升泄。病不致發。已屬萬幸。

其痰嗽未宜窮治。用藥大旨。迎夏至一陰來復。兼以扶

培胃氣為要。

人參

熟地

麥冬

五味

茯苓

山藥

勞傷  
氣虛

王八冲年形瘦腹脹食減便澹。自上秋失血以來。口加羸

血虛

吐血

羸

弱脉左堅右濇。雖陰虛起見。而中焦爲急。此非小恙。

人參

茯苓

炙草

白芍

廣皮

厚朴

席 半月前恰春分陽氣正升。因情志之動。厥陽上燔。致  
咳震動絡中。遂令失血。雖得血止。診右脉長大透寸部。  
食物不欲納。寐中呻吟囁語。由至陰損及陽明。精氣神  
不相交合矣。議飲攝神氣法。

人參

茯苓

五味

棗仁

炙草

龍骨

金箔

又服一劑。自覺添入少腹。腹中微痛。逾時自安。此方歛

手少陰之經失以和四陰不爲重堅至於直下者陽明胃虛也脈緩大長肌膚甲錯氣衰血虧如絲姑建其中參芪建中湯去姜

又 照前方去糖加茯神

又 診脾胃脈獨大爲病飲食少進不喜飲水痰多嗽頻皆土衰不生金氣金匱謂男子脈大爲勞極虛者亦爲勞夫脈大爲氣分泄越思慮鬱結心脾營損於上中而陽分萎頓極虛亦爲勞爲精血下奪肝腎陰不自立若脈細欲寐皆少陰見症今寢食不安上中爲急况厥陰風木主令春三月木火司權脾胃受戕一定至理建中

理陽之餘。繼進四君子湯。大固氣分。多多益善。

徐四因積勞久嗽見血。是在內損傷。先聖曰。勞者溫之。損

者益之。溫非熱藥。乃溫養之稱。甘補藥者。氣溫煦。味甘  
甜也。今醫見血投涼。見嗽治肺最多。予見此治法。胃口  
立即敗壞者不少。歸脾去木香黃芪加杞子。

杜二積勞思慮內損。欠血久病。秋季再發。乃夏暑氣泄。勞  
則氣愈泄不收。絡空動沸。此與陰虛有別。色脉胃減。涼  
降非法。人參建中湯。

龐血大去。則絡脉皆空。其傷損已非一腑一臟之間矣。  
秋分寒露。天氣令降。身中氣反升越。明明裏不肯收攝。

虛象何疑。今診脈弱濡瀼。肢節微冷。氣傷上逆。若烟霧迷離。薰灼喉底。故作噎逆。大旨以上焦宜降。宜通。下焦宜封宜固。得安穀崇生。再商後法。

人參

炒黑杞子

炒黑牛膝

茯神

生苡仁

炒山藥

又血止納穀甚少。不饑泄瀉。此脾胃大困。陰火上觸。面赤忽嘈。先理中宮。必得加餐為主。大忌寒涼治嗽。再伐脾胃生氣。

人參

茯神

新會皮

山藥

炙草

炒白芍



又 脉右濡左未斂。

人參

茯神

熟朮

廣皮

南棗

又 左脉靜而虛。右如數。初進穀食。宜培中宮。霜降後五日。以丸劑攝下。

人參

茯神

熟朮

廣皮

南棗

炒白芍

炙草

陳 脉如數。痰嗽失血。百日來反覆不已。每咳喘而汗出。此屬氣傷失統。絡血上泛。凡寒涼止血理嗽。不但敗胃妨食。決無一效。從仲景元氣受損。當進甘藥。冀胃土日旺。柔金自寧。

黃芪

生白芍

五味

炙草

南棗

飴糖

某勞傷嗽血

生黃芪皮

三錢

茯苓

三錢

炙黑甘草

五分

黃精

三錢

南棗

三錢

錢四一形神殯勞氣泄失血食減喘促由氣分陽分之傷非

酒色成勞之比黃芪建中湯去姜桂

陸脈細形瘦血後久咳不已復加喘促緣內損不肯充

復所投藥餌肺藥理嗽居多當此天令收肅根蒂力怯

無以攝納陰乏戀陽多升少降靜坐勉可支撐身動勃

臨證指南醫案

卷二

吐血

癸

勃氣泛所納食物僅得其悍氣未能充養精神矣。是本  
身精氣暗損爲病。非草木攻滌可却。山林寂靜兼用元  
功。經年按法。使陰陽漸交。而生生自振。徒求諸醫藥。恐  
未必有當。建中湯去姜加茯苓。

董二此內損症。久嗽不已。大便不實。夏三月。大氣主泄。血  
吐後。肌肉麻木。骨疼痠疼。陽明脈絡不用。治當益氣。大  
忌肺藥清潤寒涼。

黃芪

炙草

苡仁

白芨

南棗

米糖

李三飲酒少穀。中氣先虛。酒力溫散助熱。絡血隨熱氣以

上沸血止之後。頓然食減。脘痞。顯是中氣已困。故靜坐  
稍舒煩。言咳急。當以調中爲急。若見血見咳。卽投寒涼。  
清陽愈傷。日就敗壞矣。雖酒客忌甘。然救其苦寒。藥傷  
勿拘此例。戊巳子不加南棗。

王八脉奕形勞失血。小建中加玉竹。

顧八勞心。神耗營損。上下見血。經年日衰。今勉納穀不飢。  
中焦因不至。運滋陰清肺。更令傷中無邪。病好藥欲盡。  
其安。須山居靜養。寒暑無害。方得堅固。異功散。

錢七形瘦。肝左數。是陰分精奪。自述談笑或多。或胃中飢。  
虛必衝氣咳逆。前年已失血盈碗。此下損精血有形難。

復以畧精飲食氣返不趨急以甘藥益胃中流砥柱病至中不可緩矣

人參

茯神

炙草

山藥

許四勞倦傷陽形寒失血咳逆中年不比少壯火亢之嗽

血黃芪建中湯

徐二

奔走五日卽是勞力動傷陽氣血從右起夜有冷汗

乃陽絡空隙而泄越矣凡治吐血之初多投涼血降氣以輩其止孰知陽愈滲泄益增病劇屢矣

黃精

黃芪

炙草

苡仁

茯神

汪

肝風膨脹胃氣必虛酒客不喜柔膩肌柔色嫩質體

氣弱清明春木大旺理必犯土急宜培養中宮中有砥柱風陽不得上越而血可止矣

人參

炒黃芪

炒山藥

茯苓

炒白芍

炙草

朱二秋暑失血初春再發診脉右大頗能納食金匱云男子脉大爲勞極虛者亦爲勞要之大者之勞是煩勞傷氣脉虛之勞爲情慾致損大旨要病根驅盡安靜一年可愈

生黃芪

北沙參

苡仁

炙草

白芨

南棗

某勞力煩心失血。早食則運。暮食飽脹。踈補調中方。

人參 茯苓 炙草 生穀芽

廣皮 白芍

馮四脉弦勁。按之空豁。久嗽先有瀉血。大便不實。近又嗽五血。是積勞久損。陰陽兩虧。今食不欲餐。先宜甘溫益氣。但貧窘患此。參苓未能常繼。斯為難調。

人參 黃芪 茯苓 炙草

苡仁 白朮

許四頻頻傷風。衛陽已踈。而勞怒亦令陽傷。此失血症。當四獨理陽明胃壯。則肝犯自少。脉右空大。可証。若三陰之

胃陽虛  
衛線

熱蒸脉必參於左部

人參

一錢

黃芪

三錢

炙草

五分

煨姜

一錢

南棗

二錢

又甘溫益胃血止五日。食腥膻怒血咳復來不獨衛陽  
踈豁絡脉空動若谷。豈沉寒堵塞冀獲片時之效。倘胃  
口拒納無法可投。按脉微瀼議治心營肺衛。

人參

黃芪

炙草

南棗

白芨

茯神

棗仁

湯三脉細促。右空大。爪甲灰枯。久嗽入春夏見紅。食減身

痛。形容日瘠。是內損難復。與養營法。

人參

炒白芍

歸身

炙草



桂枝木

廣皮

煨姜

南棗

丁二夏季痰嗽入冬失血自述晝卧安逸微寒熱不來則知二氣已損傷身動操持皆與病相背脉大無神面無膏澤勞怯不復元大著溫養甘補使寢食兩安若以痰嗽爲熱日餌滋陰潤肺胃傷變症調之無益

歸芪異功散

陳二失血前後心痛歸建中去姜

某形瘦色枯脉濡寒熱失血心悸是營傷歸芪建中去姜

某脉芤汗出失血背痛此爲絡虛

人參

炒歸身

炒白芍

炙草

棗仁

茯神

某氏失血半年。心悸忡。脇下動。絡脉空。隙。管液損傷。議甘

緩辛補

枸杞

栢子仁

棗仁

茯神

炙草

桂圓

又生地

阿膠

小麥

廣三七

烏賊骨

兔絲子

茯神

補豆

夜服三錢

徐九龍課之勞。心脾營傷。食酸助木。中土更虧。春陽主升。

血乃大吐。况茹素既久。當培土。營陰損極。熱自內熾。非

臨證指南醫案

卷二

吐血

李

實火也 歸脾湯去參

陳三先患失血復遺驚駭平素有遺泄獨處囁語是有形

精血無形神氣交傷漫言治痰治血真粗工卑陋矣補

精宜填安神宜靜然無形真氣為要與心脾二經主治

人參一錢 當歸半錢 扶神三錢 棗仁三錢 塚志七分

炙草三分 桂圓二錢 龍齒二錢 金箔五張

宓 遇節血症反覆脉弱廢食脇痛胃爽無治咳止血之

理扶得胃口受納可商調理

人參 炙黃芪 當歸炭 棗仁

扶神 炙草 桂圓肉

又歸脾去木香遠志加枸杞子

圖三思精傷於心脾二臟主乎營血管出中焦脾陰受損陰虛生熱蒸蒸絡脉致血不寧靜食少痰多色澤少華皆虛象也不宜久進涼潤嗽藥當以錢氏異功散間進歸脾湯戒木香

馬六上秋下血今年湧血飲橘餅湯甘辛心中如針刺營枯液耗不受辛藥但以甘藥柔劑與心脾有益

人參

黃精

茯神

栢子仁

炙草

南棗

某老弱虛咳失血

勞心過  
度陽升

生黃芪皮 歸身

煨姜

大棗

馮

診脉左手平和。尺中微動。右手三部關前動數。尺脉帶數。夜卧不寐。咳嗆有血。晝日咳嗆無血。但行走微微喘促。夫陰陽五爲樞紐。隆冬天氣藏納。緣煩心勞神。五志皆動。陽不潛伏。當欲寐之時。氣機下潛。觸其陽氣之升。衝脉升動。絡中之血。未得寧靜。隨咳嗆溢於上。寢至於未趨言談。亦助其動。搏氣火。此咳嗆喘息失血。同是一原之恙。當靜以制動。投藥益水生金。以制君相之火。然食味宜遠辛辣熱燥。凡上實者必下虛。薄味清肅上焦。正謂安下。令其藏納也。愚見約方。參末俟裁。

生福豆

勿碎

麥冬

二錢

川斛

牛一錢

土阿膠

二錢

小根生地

錢二

真北沙參

半一錢

又

診脉同前。述心中怯冷。交四更咽中乾。咳噎連聲。必

血已盈口。論心營肺衛皆在上焦。更擬欬心液滋肺津

一法。

炒棗仁

勿研

鮮生地

錢三

天冬

一錢

炒麥冬

錢一

茯神

半一錢

黑牛膝

半一錢

茜草

一錢

參三七

磨沖一錢

又

熟地

四錢

生地

二錢

天冬

一錢

麥冬

一錢

北沙參

錢三

茯神

一錢

卧時服天王補心丹

查十二舌辣。失血易饑。

心營熱

吐血

三

生地

玄參

連翹心

竹葉心

丹參

鬱金汁

陳

血止。脈兩寸未和。仍議心營肺衛方。

生地

生扁豆

麥冬

北沙參

丹參

茯苓

陳

夜熱。和迫血妄行。議清營熱。

犀角

鮮生地

丹皮

白芍

邵

營熱失血

生地

竹葉心

玄參

丹參

川斛

茯神

王十脉右大。失血知饑。胃陽上逆。咽乾喉痒。

生地 扁豆 玄參 麥冬

川斛 新荷葉汁

某四脉右濇。初氣冲失血。咳逆能食。無味。血來潮湧。乃陽明胃絡空虛。血隨陽升而然。法當填中為要。着莫見血治咳。而用肺藥。斯症可圖。正在此歇。

大淡菜 兩 生扁豆 五錢 麥冬 二錢 川斛 三錢

茯神 三錢 牛膝炭 半錢

陶六色黃。脉小數。右空大。咳嘔血溢。飲食漸減。用建中旬日。頗安。沐浴氣動。血咳復至。當以靜藥養胃陰方。



金匱麥門冬湯去半夏

郭 脉右部不鼓擊應指。惟左寸數疾。昨晚失血之因。因於傷寒拾物。致陽明脉絡血升。今視面色微黃。爲血去之象。不宜涼解妨胃。倣古血脫必先益氣。理胃又宜遠肝。

人參

秋石水拌烘

黃芪

阿膠

茯神

炙草

生白芍

王三 腸紅愈後。吐血一兩月必發。此陽明胃絡氣血皆多。故吐後寢食如昔。久發陰虧。仍有內損之憂。宜養肺胃之陰以和陽。

生黃芪

北沙參

麥冬

生甘草

扶神

元米湯煎

程二吐血數發。肢震而熱汗出。寐中驚惕。蓋陽明脉絡已虛。厥陰風陽上熾。飲食不爲肌膚。皆消燥之徵也。

生黃芪

北沙參

生牡蠣

麥冬

小麥

南棗

程二脉左小數右弦。食減不飢。易於傷風。大便結燥。冬春已見血症。夫胃陽外應衛氣。九竅不和。都屬胃病。由冬失藏聚。發生氣少。遇長夏熱蒸。真氣漸困故也。急宜絕慾靜養。至秋分再議。

參鬚

黃芪皮

鮮蓮子

茯神

炒麥冬

生甘草

某着右卧眠。喘咳更甚。遇勞動陽痰必帶血。經年久嗽。

三焦皆病

麥門冬湯

華三勞怒用力。傷氣動肝。當春夏天地氣機皆動。病最易發。食減過半。熱升冲咽。血去後。風陽皆熾。鎮養胃陰。勿用清寒理嗽。

生扁豆

沙參

天冬

麥冬

川斛

茯神

又衝氣攻腹。遶喉。乃肝胆厥陽肆橫。久久虛損。而喘痰

減食皆犯胃之象若不靜養經年必甚

甜北沙參 生白扁豆 生黃芪皮 茯神

炙草 白糯米半升泡清湯煎藥

徐 陰臟失守陽乃騰越咳甚血來皆屬動象靜藥頗合  
屢施不應乃上下交征陽明絡空隨陽氣升降自由先  
以柔劑填其胃陰所謂執中近之 金匱麥門冬湯去  
半夏加黃芪

某<sup>五</sup>失血後咳嗽不飢此屬胃虛宜治陽明。

甜北參 生扁豆 麥冬 茯神 川斛

陸 食酸助木胃土受傷脫中陽逆絡血上溢內經辛酸

太過都從甘緩立法穀少氣衰沉苦勿進

生扁豆

北沙參

炒麥冬

茯苓

川斛

甘蔗漿

又甘涼養胃中之陰痰少血止兩寸脉大心煩脊熱汗

出營熱氣泄之後議用竹葉地黃湯

鮮生地

竹葉心

炒麥冬

建蓮肉

川斛

茯神

陶一四兩年前吐血咳嗽夏四月起大凡春盡入夏氣機升  
泄而陽氣弛張極矣陽既多動陰乏內守之職司絡血  
由是外溢今正交土旺發泄欲病氣候急養陽明胃陰

夏至後兼進生脉之屬勿步趨於炎歊烈日之中可望其漸次日安 金匱麥門冬湯去半夏

王<sub>八</sub>見紅兩年冬月加嗽入春聲音漸嘶喉舌乾燥診脉小堅厚味不納胃口有日減之虞此甘緩益胃陰主治。

麥冬

雞子黃

生扁豆

北沙參

地骨皮

生甘草

盧<sub>四</sub>脉大色蒼冬月嗽血納穀減半迄今乾咳無痰春夏間有吐血夫冬少藏聚陽升少制安閑靜養五志氣火自平可望病愈形瘦穀減當養胃土之津以生金

甜北參

麥冬

玉竹

木瓜

生扁豆

生甘草

某二脉右大左虛夏四月陽氣正升煩勞過動其陽絡中血溢上竅血去必陰傷生熱宜養胃陰大忌苦寒清火

北沙參

生扁豆

麥冬

生甘草

茯神

川斛

某九脉搏血湧飢易納食風陽過動而爲消爍若不自保攝餌藥無益

生地

天冬

丹參

茯苓

生扁豆

川斛

倪三陽明脉弦空失血後咽痺卽噎是納食雖強未得水

穀精華之游溢當益胃陰

北沙參

生扁豆

麥冬

杏仁

生甘草

糯米湯煎

徐三失血能食痰嗽色蒼脉數可與甘涼養胃中之陰胃

和金牛痔血便燥桑藥最宜

生扁豆

生地

天冬

麥冬

銀花

柿餅灰

側柏葉

某失血咽乾

稽豆皮

錢三丹參

錢一

麥冬

牛一錢

川斛

牛一錢

藕汁

一小杯

陳胃虛客氣上逆為呃噎痰帶血星咽中微痛姑擬鎮

逆胃虛氣

臨證指南醫案

卷二

吐血

三



攝法

人參 熟地炭 五味 茯神 青鉛

又 照前方去青鉛加麥冬川斛遠志炭

和肝胃不

孫三 脉小芤血去食減服地黃桑朮反覺呆滯且喜肥

甘議兩和肝胃

蘇子 茯苓 金石斛 降香

鈎藤 黑山梔

蔡三 新沐熱蒸氣泄絡血止溢出口平昔痰多又不渴飲而大便頗艱此胃氣不得下行爲順之旨兼以勞煩噴怒治在肝胃

金石斛

紫降香

炒桃仁

橘紅

薏仁

茯苓

萬脈數左堅。當夏四月。陽氣方張。陡然噴怒。肝陽勃升。絡血上湧。雖得血止。而咳逆欲嘔。眠卧不得。欬左。此肝陽左升太過。木火水酒陰虧。則生熱。是皆本體陰陽迭偏。非客邪實火。可清可降之比。最宜恬澹無爲。安靜幽閒。經年不反。可望轉偏就和。但調藥治胃。減損怯矣。經云胃欬之狀。欬逆而嘔。木犯胃土。貫膈卽至冲咽入肺。肺衰木反刑金。從內經甘緩以制其急。

米炒麥冬

糯稻根鬚

女貞子

茯神

生甘草

南棗肉

又乙癸同治益胃養陰

人參

秋石湯洗  
烘乾爲末

生地

熟地

天冬

麥冬

以人參末收實

某血去胃傷當從中治。况五年前勞怒而得病。肝木無  
不尅土。醫者溫補競進。氣壅爲脹。至夜咽乾無寐。食物  
不思。杳不知味。爲嘔爲咳。全是胃陽升逆。經云胃不和  
則卧不安。而陽不潛降。似屬濁氣膠痰有形之物。阻撓  
升降而然。古人有二虛一實。當先治實。以開一面之文。  
余從胃病爲主。制肝救中。理氣清膈。乃不足中有餘。圖

通之治此機勿得亂治

人參

枳實

半夏

杏仁

甘草

竹茹

生姜

大棗

李暴怒肝陽大升胃絡血湧甚多已失氣下行爲順之  
肯仲淳吐血三要云降氣不必降火目今不亂不納寒  
膩之藥所致

炒蘇子

降香汁

山梔

炒山楂

鬱金

茯苓

川斛

丹參

某左脉細堅搏指肝陽逆失血汗

熟地

五味

炙草

牛膝

白芍

桂心

童便冲

李氏脉細小如無素多鬱怒經來卽病冬月胃痛隨有咯血不止寒戰面赤驚惕頭搖顯是肝陽變風絡血沸起四肢逆冷真炁衰微內經有肝病暴變之文勢豈輕渺議用景岳鎮陰煎法制其陽逆仍是就下之義

熟地炭

牛膝炭

肉桂

茯神

生白芍

童便

又經來血止肝病何疑

炒查肉

當歸

炒延胡

澤蘭

桃仁

茯苓

氣

沈氏 血後久咳腕痛食減經閉便溏連服此藥

蘇子

炒丹皮

桃仁

鬱金

鈎藤

白芍

血絡

蔡三 水寒外加驚恐內迫陰癰三年繼患嗽血迄今七年

未有愈期詢及血來紫塊仍能知味安穀察其虛傷驚

傷必是肝絡凝瘀得怒勞必發勿與酒色傷損亂投滋

陰膩濁之藥恐胃氣日減致病漸劇

桃仁 三錢

鱉甲 三錢

川桂枝 七分

歸鬚 一錢

大黃 五分

羌蔚子 二錢

柴二 勞傷寒煖不勻脇痛嗽血食物不減宜降氣和絡

臨證指南醫案

卷二

吐血

辛

蘇子

茯苓

降香

橘紅

桔梗

苡仁

韭白汁

陸交春分前五日。肝木升旺之候。涎血大吐。胸脘不爽。此久鬱氣火灼熱。神志失守。遂多驚恐。絡中之血。隨火升氣逆而上。當先降其氣。不宜寒苦得阻。

蘇子

降香

丹參

查肉

桃仁

鬱金

枳殼

黑梔皮

吳

脈瀉能食咳血

降香

桃仁

鬱金

蘇子

炒山查

苡仁

韭白汁

中人

姚四此勞傷身動失血。脇有瘕聚。因咳甚而血來。先宜降氣。五

蘇子 苡仁 茯苓 黑山梔 丹皮

降香 荊芥炭 牛膝炭 藕汁

尖三形畏冷。寒熱。左脇有宿痞。失血咳嗽。曾驟勞力。經年。四 疔羸。藥不易效。

旋覆花 新絳 歸鬚 炒桃仁

栝子仁 茯神

何三左乳傍脇中。常似針刺。汗出。心嘈能食。此少陽絡脉。七 陽氣燔灼。都因謀慮致傷。將有絡血上湧之事。議清絡。



宣通勿令瘀著

生地

丹皮

澤蘭葉

桃仁

鬱金

琥珀末

又服通絡方瘀血得下新血亦傷。嘈雜善飢陽亢燔灼。營陰不得涵護也。仍以和陽熄風方法。

阿膠

雞子黃

生地

麥冬

生甘草

生白芍

王十二吐血後不飢胸背痛

蘇子

桔梗

鬱金

黃皮

山梔皮

降香

羅八因左脉堅搏兩投柔劑和陽益陰血未得止而右胸  
似痞左脇中刺痛此少陽絡脉經出之所夫膽爲清淨  
之腑陰柔滋養未能宣通絡中是痛咳未罷議以辛潤  
宣暢通劑

桃仁

丹皮

歸鬚

栝子仁

澤蘭

降香末

又照前方去降香末澤蘭加黑山梔皮

又辛潤痛嗽皆減累進苦降脇右皆痛不但絡空氣分  
亦餒古人以身半以止爲陽原無取乎沉苦

桃仁

栝子仁

鮮生地

玄參

鮮銀花

程四脉左弦右小濡據病原起於憂鬱鬱勃久而化熱蒸迫絡脉血爲上溢凝結成塊者離絡留而爲瘀也血後納食如昔是腑絡所貯頗富况腑以通爲用血逆氣亦上併澼澼有聲皆氣火旋動非有形質之物凡血病五臟六腑皆有是症當清陽明之絡爲要至於病發當治其因又不必拘執其常也

枇杷葉

苡仁

茯苓

蘇子

桑葉

丹皮

炒桃仁

降香末

某八努力咳血胸背悉痛常用仲淳法

蘇子

降香汁

炒丹皮

苡仁

冬瓜仁

炒桃仁

牛膝

川貝母

某冬令過溫。人身之氣不得潛藏。陰弱之質。血隨氣逆。診得陽明脈動。吐出痰黑。絡中離位之血。尚有未可以止瀉爲事。

生地

丹參

丹皮

降香

桃仁

牛膝

韭汁

童便冲

某肝逆失血

蘇子

鬱金

降香汁

炒丹皮

釣藤

赤芍

丹參

茯苓

白糯米湯煎

候十九胃脘當心肝經交絡所過。上布於肺。咳嗽胃旁作瘕。

腹脹。絡氣逆也。當慮失血。脈數能食。宜和絡氣。

生地

桃仁

桑葉

丹皮

麥冬

茯神

血絡源  
胸脇痛

陳二

吐血八日。腕悶脇痛。肢冷。絡傷氣窒。先與降氣和血。

蘇子

鬱金

杏仁

茯苓

桃仁

降香

翁

問。謂讀靜坐。痰血夏發。入冬不已。胸脇痛引背部。脈

小微。滿非慾傷陰火。夫痛為絡脈失和。絡中氣逆血上。

宗仲淳氣為血帥

蘇子

苡仁

茯苓

山查

桑葉

丹皮

降香末

老韭白

江診脉數。涕有血。嗽痰。冷熱外因。動肺緣素。患肝痺。左脇不耐卧着。恐陽升。血溢。微用苦辛泄降。不宜通劑。

黑山梔

桑葉

花粉

知母

瓜蒌皮

降香

沈左脇卒脹。攻觸作楚。咳痰帶血。無非絡中不得寧靜。姑進降氣通絡方。

降香汁

蘇子

苡仁

茯苓

橘紅

鈎藤

白蕤

韭白汁

又脉右長。哈血。仍宜降氣。

蘇子

苡仁

茯苓

山梔

丹皮

鈎藤

鬱金

金

飢飽勞力。氣逆血瘀。胸膈頻吐。此液耗陽升。上逆不

已。血無止期。先宜降氣通調。莫與膩塞。

蘇子

降香

桃仁

丹參

非白汁

山梔

茯苓

某

四脈弦。失血。脇痛氣逆。

枇杷葉

冬瓜子

蘇子

苡仁

炒丹皮

桃仁

降香汁

牛膝炭

方

二四憂思怫鬱。五志氣火內燔。加以烟辛泄肺。酒熱戕胃。

精華營液爲蒸，蒸化敗濁，經云陽絡傷則血外溢，蓋胃絡受傷，陽明氣血頗富，猶勉強延磨歲月，至於陽明脈絡日衰，斯背先發冷，右脇痠疼而咳吐不已，胃土愈虛，肝木益橫，厥陽愈逆，穢濁氣味無有，非自下泛上，大凡左升屬肝，右降屬肺，山中焦胃土既困，致有升無降，壅阻交迫，何以着左卧，眠過其升逆之威，且煩蒸熱灼，並無口渴飲水之狀，病情全在血絡，清熱滋陰之治，力量不能入絡，茲定清養胃陰爲主，另進通絡之義，肝膽厥陽少和，冀其涎少，脇通積久沉疴，調之非易。

桑葉

丹皮

苡仁

蘇子



鈎藤

鬱金

降香

桃仁

又桑葉

枇杷葉

苡仁

大沙參

蘇子

茯苓

鬱金

降香

又早服瓊玉膏

胡六有年冬藏失司似乎外感熱熾辛散苦寒是有餘實

症治法自春入夏大氣開泄日見厭懶長倦呼吸嘆息  
有聲脇肋室板欲痛咯哈紫血絡脉不和議以辛補通  
調不致寒凝燥結並免開格上下交阻之累

柏子仁

細生地

當歸鬚

桃仁

降香

茯神

石三先有骨痛鼓腰每至旬日必吐血隨時自冬入夏皆然近僅可仰卧着右則咳逆不已據說因怒勞致病都是陽氣過動而消渴舌翳仍納穀如昔姑以兩和厥陰陽明之陽非徒泛泛見血見嗽爲治

石膏

熟地

麥冬

知母

牛膝

又石膏

生地

知母

丹皮

大黃

桃仁

牛膝

將六宿傷怒勞動汗血溢紫塊先以降氣導血

蘇子

降香末

桃仁

黑山梔

金斛

製大黃

又 天地杞圓加棗仁茯神

某 形盛脉弦目皆黃咳痰粘濁嘔血此胃有濕熱膠痰因怒勞動肝故左脇中痛血逆而吐非虛損也當薄味靜調戒嗔怒百日可却

蘇子 降香 廣皮白 生姜 桃仁

鬱金 金斛 六服後接服海粉九半觔

某 向有背痛尚在勞力氣逆咳血乃勞傷病也

歸建中去姜加茯苓

某 二 努力傷絡失血面黃口中味甜脘中煩悶衝氣病在肝胃勿以失血治以滋膩

勞力傷

旋覆花

代赭石

半夏

淡乾姜

塊茯苓

南棗肉

呂二脉數上出右脇上疼則痰血上溢必因嗔怒努力勞  
煩致絡中氣阻所致宜安閑靜攝戒怒慎勞一歲之中  
不致舉發可云病去

降香末

八分

炒焦桃仁

錢

丹皮

錢

野鬱金

錢

茯苓

三錢

黑山梔

錢

丹參

錢

橘紅

錢

吳氏氣寒失血咳嗽心熱至暮寒熱不思納穀此怔鬱內  
損二陽病發心脾若不情懷開爽服藥無益

阿膠

麥冬

茯神

白芍

北沙參

女貞子

李氏情志久鬱氣逆痰喘入夏咳血都因五志陽升况脫有聚氣二年寡居隱曲不伸論理治在肝脾然非藥餌奏功

降香末

枇杷葉

蘇子

鬱金

瓜蒌皮

黑梔皮

茯苓

苡仁

吳氏鬱損咳血頻發當交節氣逆嘔吐肢冷厥逆所現俱是虛勞末路豈是佳景勉擬方

生白芍

烏梅

炙草

炒麥冬

扶神

橘紅

張氏

失血。口碎舌泡。乃情懷鬱勃。內因營衛不和。寒熱可

熾。病鬱延久。爲勞所喜。經水尚至。議手厥陰血分主治。

犀角

金銀花

鮮生地

玄參

連翹心

鬱金

失血一症。名目不一。茲就上行而吐者言之。三因之  
來路宜詳也。若夫外因起見。陽邪爲多。蓋犯是症者。  
陰分先虛。易受天之風熱燥火也。至陰邪爲患。不過  
甘中之一二耳。其治法總以手三陰爲要領。究其病  
在心營肺衛如何。若夫內因起見。不出乎嗔怒鬱勃  
之激傷肝臟。勞形苦志而耗損心脾。及恣情縱慾以

賊腎臟之真陰真陽也。又當以足三陰爲要領。再審其乘侮制化如何。若夫不內不外因者。爲飲食之偏。好努力及墜墮之傷。治分臟腑經絡之異。要知外因而起者。必有感候爲先。裡因而起者。必有內症可據。此三因根蒂用藥。切勿混亂。大凡理肺衛者。用甘涼肅降。如沙參、麥冬、桑葉、花粉、玉竹、川斛等類。治心營者。以輕清滋養。如生地、玄參、丹參、連翹、竹葉、骨皮等類。以此兩法爲宗。隨其時令而加減。若風淫津潤。加以甘寒。如蘆根、蔗汁、薄荷、羚羊之品。若溫淫火壯。參入苦寒。如川梔、黃芩、杏仁、石膏之品。若暑遏氣分。佐

滑石鮮荷之開解在營與銀花犀角之清芳秋令選  
純甘以清燥冬時益清補以助藏凡此爲外因之大  
畧所云陰邪爲患者難以並言也舊有麻黃人參芍  
藥湯先生有桂枝加減法至於內因傷損其法更繁  
若噴怒而動及肝陽血隨氣逆者用繆氏氣爲血帥  
法如蘇子藪金桑葉丹皮降香川貝之類也若鬱勃  
日久而傷及肝陰木火內燃陽絡者用柔肝育陰法  
如阿膠雞黃生地麥冬白芍甘草之類也若勞煩不  
息而偏損心脾氣不攝血者用甘溫培固法如保元  
湯歸脾湯之類也若縱慾而竭其腎真或陽亢陰騰



或陰傷陽越者有從陰從陽法。如青鉛六味。肉桂七味。並加童便之類也。若精竭海空。氣泛血湧者。先生用急固真元。大補精血法。如人參。枸杞。五味。熟地。河車。紫石英之類也。凡此爲內因之大畧。至於不內不外。因亦非一種。如案中所謂。烟辛泄肺。酒熱戕胃之類。皆能助火動血。有治上治中之法。如葦莖湯。甘露飲。茅根藕汁等劑。在人認定而用之可也。墜墮之傷。由血瘀而泛。大抵先宜導下。後宜通補。若努力爲患。屬勞傷之根。陽動則絡鬆血溢。法與虛損有間。滋陰補氣。最忌凝滯。如當歸建中湯。旋覆花湯。虎潛丸。金

剛四斤九。取其有循經入絡之能也。凡此爲不內外  
因之大畧。但血之主司者。如心肝脾三臟。血之所生  
化者。莫如陽明胃腑。可見胃爲血症之要道。若胃有  
不和。當先治胃也。仁齋直指云。一切血症。經久不愈。  
每每以胃藥收功。想大黃黃連瀉心湯。犀角地黃湯。  
理中湯。異功散。雖補瀉寒溫不同。確不離此旨。所以  
先生發明治胃方法。獨多有薄味調養胃陰者。如金  
匱麥冬湯。及沙參扁豆茯苓石斛之類。有甘溫建立  
中陽者。如人參建中湯。及四君子加減之類。有滋陰  
而不碍胃。甘守津還者。如復脈湯加減之類。其餘如

補土生金法。鎮肝益胃法。補脾疏胃法。寧神理胃法。  
腎胃相關法。無分症之前後。一遇胃不加餐。不饑難  
運。諸候。毋從此義見長。源源生化不息。何患乎病之  
不易醫也。邵新甫

# 失音

寒熱客  
邪起肺

吳三六外冷內熱久逼失音用兩解法麻杏甘膏湯

宋十三先失音繼喉痺是氣分窒塞微寒而熱水飲喻出咯痰隨出隨阻此仍在上痺舌黃口渴議與苦辛寒方

射干

麻黃

杏仁

生甘草

石膏

苡仁

陸二秋涼燥氣咳嗽初病皮毛凜凜冬月失音至夏未愈而納食頗安想屢經暴冷暴暖之傷未必是二氣之餒倣金實無聲議治

麻黃

杏仁

生甘草

石膏

射干

苡仁

又

蘆根汁

杏仁汁

萊菔汁

鮮竹瀝

熬膏

胆火喉

范三

氣燥喉痺失音少陽木火犯上

生雞子白

冬桑葉

丹皮

麥冬

生白扁豆殼

氣分燥津液虧

某

喉乾失音一月未復津液不上供肺失清肅右寸脉

浮大

枇杷葉

一錢半

馬兜鈴

八分

地骨皮

一錢

桑皮

八分

麥冬

一錢

生甘草

三分

桔梗

六分

白粳米

一錢

失音  
痰

某 血後音啞便澀

生福豆 炒白芍 炙草 川斛

山藥 米糖 大棗

何 勞損氣喘失音全屬下元無力氣不得上注紛紛  
清熱治肺致食減便澀改投熱藥又是劫液宜乎喉痛  
神疲矣用補足三陰方法

熟地 五味 炒山藥 茯苓

芡實 建蓮肉

孫 久咳失音喉痺

陳阿膠 同煎 錢生雞子黃 同煎 炒麥冬 一錢 川斛 三錢

失音 全

甜北沙參

半錢

炒生地

二錢

生甘草

三分

扶神

半錢

夫宮商角徵羽歌哭呼笑呻此五臟所屬之音聲也。原其發聲之本在於腎其標則在乎肺。病有虛實由咳嗽而起者居多。或肺有燥火外感寒邪火氣鬱遏而瘖者有肺金燥甚木火上炎咽乾喉痺而瘖者有風熱痰涎壅遏肺竅而瘖者有與怒叫號致傷會厭者亦有龍相之火上炎燔燥肺金久咳不已而瘖者有內奪而厥則爲瘖俳此腎虛也是即暴中之不能言者也。先生有金空則鳴金實則無聲金破碎亦無聲此三言足以該之矣。有邪者是肺家實也無邪者

是久咳損肺。破碎無聲也。其治法有寒者散寒。有火者清火。有風痰則祛風豁痰。若龍枯上炎。燥肺者。宜金水同治。若暴中之瘖。全屬少陰之虛。宜峻補肝腎。或稍兼痰火而治之。其用藥總宜甘潤。而不宜苦燥。斯得之矣。華岫雲



辛散  
傷肺  
胃津液

# 肺痿

洪二勞煩經營陽氣弛張即冬溫外因咳嗽亦是氣泄邪  
侵辛以散邪苦以降逆希冀嗽止而肺欲辛過辛則正  
氣散失音不能揚色消吐涎喉痺是肺痿難治矣倣內  
經氣味過辛主以甘緩

北沙參

炒麥冬

飴糖

南棗

查二脉細心熱呼吸有音夜寤不寐過服發散氣泄陽傷  
為肺痿之病仲景法以胃藥補母救子崇生氣也

金匱麥門冬湯

徐四肺痿頻吐涎沫食物不下並不渴飲豈是實火津液  
蕩盡二便日少宗仲景甘藥理胃乃虛則補母仍佐宣  
通腕間之枵格

人參

麥冬

熟半夏

生甘草

白梗米

南棗肉

沈積勞憂思固是內傷冬溫觸入而爲咳嗽乃氣分先  
虛而和得外寒辛散斯氣分愈泄滋陰非能安上咽痛  
音啞虛中邪伏恰值春暖陽和脈中脈外氣機流行所  
以小效旬日者生陽漸振之象穀雨暴冷驟加衛陽久  
弱不能擁護致小愈病復診得脈數而虛偏大於右寸

口吐涎沫不能多飲湯水。面色少華。五心多熱。而足背浮腫。古人謂金空則鳴。金實則無聲。金破碎亦無聲。是為肺病顯然。然內傷虛飲為多。虛則補母。胃土是也。肺痿之病。議宗仲景麥門冬湯。

王十遺。湯流膿經年。脉細色奪。聲嘶食減。咳嗽。喉中梗痛。皆漏損脂液。陰失內守。陽失外衛。肺痿之病。諒難全好。

人參

黃芪

苡仁

炙草

歸身

白芨

顧三久咳神衰氣促汗出。此屬肺痿。

黃芪

案炙八兩

生苡仁

二兩

白百合

四兩

炙黑甘草

二兩

氣不

湯

白芨

四兩

南棗

四兩

水熬膏米飲湯送

肺氣不降咳痰喘逆

鮮蘆根

桃仁

絲瓜子

苡仁

肺痿一症概屬津枯液燥多由汗下傷正所致夫痿者萎也如草木之萎而不榮為津亡而氣竭也然致痿之因非止一端金匱云或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下之重亡津液故令肺熱乾痿也肺熱乾痿則清肅之令不行水精四布失度脾氣雖散津液上歸於肺而肺不但不能自滋其乾亦不能內灑陳於六腑外輸精於皮毛也

其津液留貯胃中得熱煎熬變爲涎沫段師作咳嗽之不已故乾有自乾唾者自唾愈唾愈乾痰病成矣金匱治法貴得其精意大意生胃津潤肺燥補真氣以通肺之小竅清火熱以復肺之清肅故外臺用炙甘草湯在於益肺氣之虛潤肺金之燥千金用甘草湯及生姜甘草湯用參甘以生津化熱姜棗以宣上焦之氣使胃中之陽不滯而陰火自熄也及觀先生之治肺痿每用甘緩理虛或宗仲景甘藥理胃虛則補母之義可謂得仲景心法矣鄒時乘